

بريدو 15 ملغم/5 مللتر شراب بريدنيزولون فوسفات الصوديوم

اقرأ هذه النشرة جيداً قبل استخدام أو تناول هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج لقراءتها لاحقاً.
في حال كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، يرجى استشارة الطبيب، الصيدلي، أو الممرض.
لقد تم صرف هذا الدواء لك بناءً على وصفة طبية، فلا تعطه لأي شخص آخر لأنه قد يؤذيهِ حتى لو تشابهت لديك علامات المرض.
يرجى الاتصال بالطبيب، الصيدلي، أو الممرض في حال ظهور أية آثار جانبية بما فيها الآثار التي لم يتم ذكرها في هذه النشرة. انظر "الآثار الجانبية المحتملة".

تتضمن هذه النشرة معلومات متعلقة بالمستحضر الصيدلاني المعروف باسم بريدو.

تحتوي هذه النشرة على:

1. ما هو بريدو وما هي دواعي استخدامه
 2. ما الذي تحتاج أن تعرفه قبل القيام بتناول أو استخدام بريدو
 3. طريقة استخدام بريدو
 4. الآثار الجانبية المحتملة
 5. ظروف تخزين بريدو
 6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية
- بريدنيزولون هو دواء ستيرويدي، ويتم وصفه للعديد من الحالات المختلفة، بما فيها الأمراض الخطيرة.
 - تحتاج تناوله بانتظام من أجل الحصول على الفائدة القصوى من العلاج.
 - لا تتوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث إلى طبيبك. قد تحتاج إلى تقليل الجرعة تدريجياً.
 - قد يسبب بريدنيزولون آثاراً جانبية لدى بعض الأشخاص (اقرأ القسم 4 أدناه). بعض الآثار الجانبية مثل التقلبات المزاجية (الشعور بالاكتئاب أو "الابتهاج") أو مشاكل المعدة قد تحدث على الفور. في حال شعورك بتوسعك بأي شكل من الأشكال، تابع تناول الشراب، ولكن عليك زيارة طبيبك على الفور.
 - بعض الآثار الجانبية تحدث فقط بعد أسابيع أو شهور. قد تشمل ضعف الذراعين والساقين أو يصبح الوجه مدور بشكل أكبر (اقرأ القسم 4 لمزيد من المعلومات).
 - ابتعد عن الأشخاص المصابين بمرض جذري الماء أو الهربس النطاقي، إذا لم تصب بهما سابقاً. حيث قد يؤثر عليك بشكل خطير. في حال التلامس مع أحد المصابين بمرض جذري الماء أو الهربس النطاقي، عليك زيارة طبيبك على الفور.

1. ما هو بريدو وما هي دواعي استخدامه

يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة بريدنيزولون، والتي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى الستيرويدات القشرية أو "الستيرويدات". تعمل الستيرويدات على تقليل التهابات وخفض الاستجابة المناعية للجسم.

يستخدم بريدو في علاج العديد من الأمراض الالتهابية بما في ذلك الربو الشديد، التهاب المفاصل الروماتويدي، ردود الفعل التحسسية، الحالات الجلدية الشديدة، وبعض اضطرابات الدم.

بريدو - معلومات مفيدة

ينتمي بريدو إلى مجموعة من الأدوية تسمى الستيرويدات. اسمها الكامل الستيرويدات القشرية. توجد الستيرويدات القشرية في الجسم بشكل طبيعي وهي تساعد في الحفاظ على الصحة والعافية. يعد تعزيز الجسم بستيرويدات قشرية إضافية (مثل بريدنيزولون) طريقة فعالة لعلاج العديد من الأمراض التي تشمل أي التهابات في الجسم. يقلل بريدو من هذه الالتهابات، التي إذا استمرت قد تسبب تدهور حالتك. يجب عليك تناول هذا الدواء بانتظام من أجل أن تحصل على الفائدة القصوى منه.

2. ما الذي تحتاج أن تعرفه قبل القيام بتناول أو استخدام بريدو

لا تستخدم بريدو:

- إذا كنت تعاني من حساسية لبريدنيزولون أو لأي من المواد الأخرى المستخدمة في تركيبة هذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- تشمل ردود الفعل التحسسية الأعراض البسيطة مثل الحكة و/أو الطفح الجلدي. تشمل الأعراض الأكثر شدة تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحلق مع صعوبة في البلع أو التنفس؛
- إذا تم إعطاؤك مطعوم مؤخراً أو كنت تخطط لأخذ مطعوم.
- إذا تعرضت لعدوى فيروسية مثل الحصبة، جذري الماء أو الهربس النطاقي أو أي عدوى أخرى. أخبر طبيبك على الفور في حال التلامس مع أي شخص مصاب بالحصبة، جذري الماء أو الهربس النطاقي في الشهور الثلاثة الماضية.
- إذا كنت تعاني من عدوى الديدان الاستوائية
- إذا كنت تعاني من عدوى فطرية جهازية

الاحتياطات والتحذيرات

- تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول بريدو، خصوصاً إذا كنت تعاني، عانيت مسبقاً أنت أو أحد أفراد عائلتك من:
- اكتئاب شديد أو مرض هوسي اكتئابي (اضطراب ثنائي القطب). يشمل ذلك الإصابة بالاكتئاب قبل أو في أثناء تناول أدوية الستيرويدات مثل بريدو.
 - السل (التدرن)؛
 - مرض السكري؛
 - الصرع؛
 - الاكتئاب أو مرض عقلي آخر؛
 - مرض في العين يسببه ارتفاع ضغط العين (الزرق)؛
 - ترقق العظام (هشاشة العظام)؛
 - مشاكل في العضلات عند تناول الستيرويدات سابقاً؛
 - تقرحات في المعدة؛
 - فشل كلوي، ارتفاع ضغط الدم، فشل القلب أو التعرض مؤخراً لنوبة قلبية؛

- نوبة التصلب الجلدي (المعروفة أيضاً بالتصلب الجهازى، اضطراب المناعة الذاتية) لأن الجرعات اليومية البالغة 15 ملغم أو أكثر قد تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة تدعى نوبة التصلب الجلدي والنوبة

الكلىة. تشمل علامات نوبة التصلب الجلدي والنوبة الكلىة، زيادة في ضغط الدم وانخفاض في إنتاج البول. قد ينصح الطبيب بإجراء فحوصات لضغط دمك وللبول بانتظام؛

- أي مشكلات بالكبد؛
- قصور الغدة الدرقية.

إذا كان ينطبق عليك أي مما سبق، أو إذا لم تكن متأكداً، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.

مشاكل الصحة العقلية أثناء تناول بريدينزولون

قد تحدث مشاكل الصحة العقلية أثناء تناول الستيرويدات مثل بريدينزولون (انظر أيضاً القسم 4، "الآثار الجانبية المحتملة").

- قد تكون هذه الأمراض شديدة.
- عادةً ما تظهر في غضون أيام أو أسابيع قليلة من بدء تناول العلاج.
- من المرجح حدوثها بشكل أكبر مع الجرعات العالية.
- تختفي معظم هذه المشاكل في حال تقليل الجرعة أو إيقاف الدواء. لكن في حال ظهور مشاكل، فقد تحتاج إلى علاج.

أخبر الطبيب في حال ظهور أي علامات عليك (أو على شخص يتناول هذا الدواء) تنذر بمشاكل تتعلق بالصحة العقلية. يعد ذلك أمراً مهماً خصوصاً في حال شعورك بالاكتئاب أو في حال التفكير بالانتحار. حدثت مشاكل تتعلق بالصحة العقلية أيضاً عند القليل من الحالات عندما تم تقليل الجرعات أو إيقاف الدواء تماماً.

تحدث إلى الطبيب إذا كانت الرؤية غير واضحة، تواجه صعوبة في القراءة أو عند حدوث أي تغيير آخر في الرؤية أثناء أو بعد العلاج.

ينصح بإجراء فحوصات منتظمة مع الأطباء (بما في ذلك فحوصات الرؤية على فترات زمنية مدتها ثلاثة أشهر) خلال فترة العلاج على المدى الطويل.

الأدوية الأخرى وبريدو

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية. يعد ذلك أمراً مهماً خاصةً إذا كنت تتناول:

- أدوية الصرع مثل كاربامازيبين، فينوباربيتون، فينيتوين أو بريميدون؛
- المضادات الحيوية مثل ريفاميسين، إيريثروميسين؛
- ميفيبريستون (يستخدم لإجهاض الحمل)؛
- ريتونافير (يستخدم لعلاج فيروس العوز المناعي البشري)؛
- وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم؛
- سوماتروبين (يستخدم لعلاج مشاكل النمو)؛
- أدوية مرض السكري مثل الأنسولين، جليبانكلاميد أو الميتفورمين؛
- الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، مثل مدرات البول (أقراص الماء) مثل: بيندروفولوميثايزيد وفوروسيميد؛
- وارفارين أو الأدوية الأخرى المستخدمة لترقيق الدم؛
- الأسبرين أو الأدوية المشابهة؛
- ثيوفيلين (يستخدم لعلاج الربو)؛

- الأدوية المستخدمة لعلاج العدوى الفطرية مثل الأمفوتريسين، كيتوكونازول؛
- أسيتازولاميد (يستخدم لعلاج الزرق)؛
- كاربينوكسولون (يستخدم لعلاج تقرحات المعدة)؛
- ميثوتريكسات (يستخدم لالتهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية وأنواع معينة من السرطان)؛
- أي دواء ينتمي إلى مجموعة الأدوية التي تسمى المحاكيات الودية؛
- الأدوية المستخدمة لعلاج الوهن العضلي الوبيل؛
- الأدوية المستخدمة لجعل الأشعة السينية أوضح؛
- سيكلوسبورين (يستخدم لوقف رفض الجسم لزراعة نخاع العظم أو الأعضاء).

يرجى إخبار طبيبك إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

قد تزيد بعض الأدوية من تأثير بريدو وقد يرغب طبيبك في مراقبتك بعناية إذا كنت تتناول هذه الأدوية (بما في ذلك بعض الأدوية لفيروس العوز المناعي البشري: ريتونافير، الكوبيكسات).

الحمل، الرضاعة والخصوبة

إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء، إذا كنت حاملاً أو تقومين بالرضاعة الطبيعية، تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل.

الحمل

خلال فترة الحمل، يجب أن يبدأ العلاج فقط بعد إجراء تقييم دقيق للمنافع/المخاطر. نظراً لأنه لا يمكن استبعاد تأخر النمو والأضرار التي ستلحق بالجنين بعد المعالجة المطولة بالستيرويدات القشرية أثناء الحمل، يرجى إبلاغ طبيبك إذا كنت تريدين الحمل، كنتِ حامل بالفعل أو إذا كنت تعتقدين أنك حامل.

الرضاعة

تعتبر الستيرويدات القشرية، مثل بريدينزولون في حليب الثدي. لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن الأضرار التي ستلحق بالرضيع. مع ذلك، عند إعطاء جرعات عالية من بريدينزولون، يجب عليك تجنب الرضاعة الطبيعية لمدة 4 ساعات بعد الجرعة. يرجى استشارة طبيبك.

الخصوبة

تم ملاحظة اضطرابات عكسية في تكوين الحيوانات المنوية بعد جرعات عالية من بريدينزولون (30 ملغم/يوم لمدة 4 أسابيع على الأقل)، والتي استمرت لعدة أشهر بعد التوقف عن تناول الدواء.

تأثير بريدو على القيادة واستخدام الآلات

ينبغي ألا يؤثر هذا الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

يحتوي بريدو على ميثيل بارا-هيدروكسي البنزوات (ميثيل بارابين)، بروبيلين جليكول وسكر
يحتوي بريدو على ميثيل بارا-هيدروكسي البنزوات (ميثيل بارابين)

- قد يسبب ردود فعل تحسسية (من المحتمل أن تكون متأخرة).

يحتوي بريدو على بروبيلين جليكول

- إذا كان عمر طفلك أقل من 5 سنوات، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل إعطائه هذا الدواء، خاصة إذا كان يستخدم أدوية أخرى تحتوي على بروبيلين جليكول أو كحول.

يحتوي بريدو على سكر

- ينبغي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند مرضى السكري. إذا أخبرك طبيبك بأن لديك حساسية تجاه بعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا المستحضر الطبي.

3. طريقة استخدام بريدو

- قم دائماً بتناول هذا الدواء تماماً كما وصفه لك طبيبك. تحقق من طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
- من الأفضل تناول الشراب دون تخفيف.
- يجب تناول الشراب عن طريق الفم.
- يفضل تناول الشراب كجرعة واحدة في الصباح. مع ذلك، يمكن الاعتماد على جرعة يومية مقسمة إذا لزم الأمر.
- لدى الأطفال، يفضل تناول الدواء كجرعة واحدة على أيام متناوبة.
- قم برجّ الشراب جيداً قبل الاستخدام.
- إذا كنت تخضع لعلاج على مدى طويل، فتأكد من عدم نفاذ كمية الشراب لديك.
- تعتمد الجرعة على الحالة التي تتم معالجتها، وللبالغين، يمكن أن تتراوح بشكل كبير بين 10 ملغم و30 ملغم يومياً مقسمة على جرعات. سيعطيك طبيبك أقل جرعة تناسب حالتك.
- تحتوي العبوة على حقنة للاستخدام الفموي لقياس الجرعة بحجم 5 مللتر.

الاستخدام لدى الأطفال

- لعلاج نوبات الربو الحادة، قد يصف طبيب طفلك ما يلي:
- للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، 10 ملغم يومياً، حتى ثلاثة أيام؛
- بالنسبة للأطفال من عمر سنتين حتى 5 سنوات، 20 ملغم يومياً. العلاج لمدة تصل إلى 3 أيام عادة ما يكون كافياً، ولكن سيتم تحديد مدة العلاج من قبل طبيبك، وفقاً لعدد الأيام اللازمة للتعافي.
- بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، 30 ملغم أو أكثر يومياً (حتى 40 ملغم يومياً). في حال تم وصف أكثر من 30 ملغم يومياً، اسأل طبيب طفلك، لأنه قد يكون شكل جرعة مختلفة من بريدنيزولون أكثر ملاءمة.

إذا شعرت أن هذا الدواء له تأثير قوي جداً أو ضعيف جداً، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

إذا تناولت جرعة زائدة من بريدو

إذا تناولت جرعة زائدة من بريدو عما تم وصفه لك، فاتصل بطبيبك أو قسم الطوارئ في أقرب مستشفى منك على الفور. اصطحب هذه النشرة و/أو العبوة معك لتبين لطبيبك ما تناولته.

إذا نسيت تناول بريدو

إذا نسيت تناول بريدو، تناول الجرعة التالية بمجرد أن تتذكر ذلك ما لم يكن وقت الجرعة التالية قد اقترب. لا تقم بتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول بريدو

تحدث مع طبيبك إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول هذا الشراب – فقد يرغب طبيبك في تقليل جرعتك تدريجياً.

لا تتوقف عن تناول هذا الشراب ما لم يخبرك طبيبك بذلك، حتى إذا شعرت بتحسن، حيث إن ذلك قد يجعلك تشعر بأنك لست في صحة جيدة. إذا توقفت عن تناول الشراب فجأة، فقد يتسبب ذلك في حدوث أعراض انسحابية مثل الحمى، المرض، ألم في العضلات وفي المفاصل، سيلان الأنف، تقرح، احمرار وديق العينين (التهاب الملتحمة)، حكة في الجلد وفقدان الوزن.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، إلا أنه ليس بالضرورة أن تحدث لدى جميع مستخدمي هذا الدواء.

يمكن أن تتسبب الستيرويدات بما في ذلك بريدنيزولون في حدوث مشاكل شديدة تتعلق بالصحة العقلية، مثل تلك المدرجة أدناه. هي شائعة الحدوث في كل من البالغين والأطفال. إذا لاحظت ظهور أي من هذه المشكلات، تحدث إلى طبيبك فوراً:

- الشعور بالاكئاب، بما في ذلك التفكير في الانتحار.
- الشعور بالابتهاج (الهوس) أو شعورك بحالات مزاجية متقلبة.
- الشعور بالقلق، وجود مشاكل في النوم، مواجهة صعوبة في التفكير أو شعورك بالارتباك وفقدان الذاكرة.
- الشعور، سماع أو رؤية أشياء غير موجودة (الهالوس). لديك أفكار غريبة ومرعبة، تتسبب في تغييرات في تصرفاتك أو الشعور بالوحدة.

يمكن أن تكون الآثار الجانبية التالية بمثابة علامات على رد فعل تحسسي. إذا لاحظت أيّاً مما يلي، فتوقف عن تناول بريدو وأخبر طبيبك فوراً:

- حكة أو طفح جلدي؛
- تورم الوجه، الشفتين أو الحلق؛
- صعوبة في التنفس أو الصفير.

يمكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية في حال تناول الستيرويدات بجرعات كبيرة لفترة طويلة:

- الشعور العام بالتعب؛
- الغثيان؛
- الفواق؛
- عسر الهضم أو شعور بانزعاج بالمعدة؛

- قرحة المعدة (حيث يمكن أن تتسبب في فتق ونزيف) أو قرحة في المريء؛
- السلاق؛
- التهاب البنكرياس مما يتسبب في وجود ألم بالبطن (التهاب البنكرياس)؛
- ضعف في العضلات؛
- ألم في العضلات؛
- ترقق العظام والذي يزيد من احتمالية حدوث الكسور (هشاشة العظام)؛
- تلف بالأوتار؛
- تيبس المفصل مما يتسبب في تقييد الحركة، ألم وتشنجات عضلية؛
- احتباس السوائل مما يتسبب في وجود تورم؛
- الشعور بالجفاف؛
- ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)؛
- التنام الجروح ببطء، ترقق الجلد، التكدم، حب الشباب، العلامات التي تشبه علامات التمدد؛
- بقع صغيرة حمراء، أرجوانية أو زرقاء توجد على سطح الجلد (تسببها الأوعية الدموية تحت الجلد)؛
- قصور في وظائف الغدة الكظرية؛
- تباطؤ نمو الرضع، الأطفال والمراهقين؛
- عدم انتظام أو توقف الدورة الشهرية؛
- وجه متورم مستدير (وجه كوشينغ أو وجه بدري)؛
- فرط نمو الشعر؛
- ازدياد الشهية للطعام وزيادة الوزن؛
- عدم تحمل الكربوهيدرات؛
- تقلبات في الحالة المزاجية، الإدمان، الاكتئاب، صعوبة في النوم، تفاقم الفصام؛
- صداع شديد يصاحبه عدم وضوح في الرؤية أو مشاكل مؤقتة في الرؤية لدى الأطفال (عادة بعد إيقاف العلاج)؛
- تفاقم حالات الصرع؛
- ارتفاع الضغط في العينين (الزرق)، كاتاركت، ترقق والتهاب القرنية (جزء من العين)، تفاقم أمراض العيون الفيروسية أو الفطرية، عدم وضوح في الرؤية ومشاكل بصرية، اضطرابات المشيمية والشبكية (اعتلال المشيمية والشبكية)؛
- نوبة قلبية (آلام شديدة مفاجئة بالصدر)؛
- تغيرات في كيمياء الجسم؛
- زيادة في عدد كرات الدم البيضاء؛
- تكوّن جلطات دموية؛
- البُرفيرية؛
- متلازمة ستيفنز-جونسون؛
- قد يؤدي استخدام جرعات كبيرة ولفترة طويلة من الستيرويدات إلى ضعف الجهاز المناعي، والذي يمكن أن يزيد من خطر تدهور حالتك (الخبائة).

نوبة التصلب الجلدي والنوبة الكلوية لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من تصلب جلدي (اضطراب المناعة الذاتي). تشمل علامات نوبة التصلب الجلدي والنوبة الكلوية، زيادة في ضغط الدم وانخفاض في إنتاج البول.

لقد تم الإبلاغ عن حدوث ساركومة كابوزي (نوع من أنواع السرطان) لدى المرضى الذين يتناولون الستيرويدات القشرية. مع ذلك، قد يختفي هذا بمجرد توقف العلاج.

يمكن أن يسهل هذا الدواء من إصابته بحالات عدوى نادرة جداً ما تكون مميتة. يمكن أن تتدهور حالات العدوى مثل جذري الماء والحصبة أو قد تتكرر الإصابة بالسل (التدرن).

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك، الصيدلي أو الممرض. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة.

5. ظروف تخزين بريدو

احفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال. يحفظ عند درجة حرارة أقل من 30° مئوية. يحفظ داخل العبوة الأصلية. مدة الصلاحية بعد الفتح لأول مرة هي شهر واحد. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية. يشير تاريخ الانتهاء إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر. لا تستخدم هذا الدواء إذا لاحظت أي علامات تلف واضحة عليه. لا تتخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. اتبع هذه الإجراءات للحفاظ على سلامة البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات إضافية

ما هي محتويات بريدو

المادة الفعالة هي بريدنيزولون فوسفات الصوديوم.

يحتوي كل 1 مللتر من بريدو 15 ملغم/5 مللتر شراب على بريدنيزولون فوسفات الصوديوم يكافئ 3 ملغم بريدنيزولون.

المواد الأخرى المستخدمة في التركيبة التصنيعية هي ميثيل بارابين، بروبيلين جليكول، جليسيرين، فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة، فوسفات الصوديوم أحادي القاعدة، إيديتا ثنائي الصوديوم، سكارين الصوديوم، نكهة كريم كراميل السائلة، نكهة التوت السائلة، سكر، FD&C رقم 40 وماء منقى.

ما هو الشكل الصيدلاني لبريدو ووصفه وحجم عبوته

بريدو 15 ملغم/5 مللتر شراب هو شراب سائل نقي ذو لون أحمر بنكهة التوت.

بريدو 15 ملغم/5 مللتر شراب متوفر في قنينة زجاجية كهربائية محكمة الإغلاق بغطاء ذو لون أبيض مقاوم لعبث الأطفال. تحتوي العبوة أيضاً على حقنة للاستخدام الفموي لقياس الجرعة حجمها 5 مللتر.

حجم العبوة: قنينة واحدة (120 مللتر).

اسم وعنوان مالك رخصة التسويق

شركة الجزيرة للصناعات الدوائية

طريق الخرج

صندوق بريد 106229

الرياض 11666، المملكة العربية السعودية

هاتف: 8107023 (966-11) +، 2142472 (966-11) +

فاكس: 2078170 (966-11) +

البريد الإلكتروني: jpimedical@hikma.com

الشركة المصنعة

شركة الجزيرة للصناعات الدوائية

طريق الخرج

صندوق بريد 106229

الرياض 11666، المملكة العربية السعودية

هاتف: 8107023 (966-11) +، 2142472 (966-11) +

فاكس: 2078170 (966-11) +

البريد الإلكتروني: jpimedical@hikma.com

للحصول على معلومات تتعلق بهذا الدواء، اتصل بالممثل المحلي للشركة

مالكة رخصة التسويق على الرقم التالي:

• المملكة العربية السعودية

هاتف: 4173731 (966-11) +، فرع: 1086

تمت مراجعة هذه النشرة بتاريخ 2019/08؛ رقم النسخة SA1.0.

للإبلاغ عن الآثار الجانبية

تحدث إلى الطبيب، الصيدلي، أو الممرض إذا عانيت من أية آثار جانبية، بما فيها الآثار الجانبية التي لم يتم ذكرها في هذه النشرة. كما أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الآثار مباشرة من خلال الاتصال بالجهات المذكورة أدناه. يساعد الإبلاغ عن الآثار الجانبية بتوفير معلومات مهمة عن مأمونية الدواء.

• المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للتبليغ الدوائي

فاكس: 2057662 (966-11) +

رقم الهاتف: 2038222 (966-11) +، فرع: 2340-2356-2317

الرقم المجاني: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>

• في بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية المختصة في كل دولة.

هذا مستحضر دوائي

- يؤثر المستحضر الدوائي على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات الموصى بها يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة تعليمات الطبيب وطريقة الاستعمال الموصى بها وتعليمات الصيدلي الذي قام بصرفه لك.
- إن الطبيب والصيدلي خبيران بالمستحضرات الدوائية وينفعها وضررها.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- احفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيادلة العرب