

أبرز التغييرات في النظام للطبيب

System Changes for Physicians

Version 3.3



للحصول على أفضل أداء، لموقع وصفتي الإلكتروني نوصي باستخدام المتصفحات التالية:
(Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox)
علماً بأن Internet Explorer غير مدعوم كلياً بسبب توقف دعم شركة مايكروسوفت لهذا المتصفح.

أبرز التغييرات

قائمة الوصفات

عرض تاريخ الوصفه الطبية:

عرض تاريخ الوصفات الطبية هي خاصية تمكنك من رؤية جميع الوصفات للمرضى من جميع المنشآت و المراكز الطبية مع عرض تفاصيلها.

- خطوة 1: إضغط على "عرض تاريخ الوصفه الطبية"
- خطوة 2: إستخدام البحث بالتاريخ. يمكن ملاحظة البحث أعلى القائمة، و تصفية البحث بإدخال التاريخ المرغوب.

ملاحظة: الخانة "إلى" في التاريخ بها تاريخ اليوم تلقائي، و الخانة "من" بها تاريخ شهر سابق للتاريخ الحالي.
بالنظام.

- خطوة 3: من المهم ملاحظة أن النتائج للبحث هي إفتراضيا للوصفات الإلكترونية، في حالة الرغبة في البحث عن "الوصفات الورقية" يمكنك اختيار النوع من نوع الوصفات السابقة في البحث.

حالة الصرف:

في قائمة الوصفات الطبية ، يمكن للطبيب الاطلاع على حالة صرف الوصفات الطبية الصادرة عن أي طبيب للمريض كما هو مطلوب ، أي ما إذا كان يتم صرف كل وصفة طبية أو صرفها جزئيًا أو عدم صرفها.

عرض حالة الصرف في القائمة:

يمكن عرض حالة صرف المعاملة في قائمة وصفات الطبيب , ومع ذلك يجب على الطبيب النقر فوق زر حالة التحديث في خيارات المعاملة.
ملاحظة هامة:

- زر التحديث يختفي في حالة إذا كانت الوصفة كاملة الصرف, ملغية, منهية, أو محظورة.

البحث عن طريق حالة الصرف:

في البحث , يمكن للطبيب تصفية المعاملات باستخدام حقل البحث المضاف حديثًا لحالة الصرف.



الخطوة 1: اضغط على حالة الصرف
الخطوة 2: اختر من القائمة المنسدلة

- مصروفة
- مصروفة جزئياً
- غير مصروفة



إلغاء الوصفة الطبية:

إلغاء الوصفة الطبية هي وظيفة تسمح للطبيب بإلغاء الوصفات الطبية النشطة الحالية الصادرة عن أي طبيب آخر للمريض كما يتطلب.

الخطوة 1: الضغط على إلغاء وصفة

الخطوة 2: لاسترداد معلومات الوصفة, الحقول التالية مطلوبة:




• معرف المريض

• معرف المستند

• رقم الإقامة

• رقم الاتصال

• الرقم المرجعي للوصفة الطبية



الخطوة 3: بعد إضافة المعلومات المطلوبة، انقر فوق الحصول على الوصفة.
الخطوة 4: أضف سبب الإلغاء.

معر.	الدواء (الرمز - الوصف)	تعليمات	الكمية	ملاحظات	دواعي الإ...
14512 27	paracetamol 500 mg Tablets (ORAL) Code: 106801-117-074	Take 500 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 30 Day(s). تناول 500 ميليجرام عن طريق الفم مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 30 يوم (أيام). طريقة تناول: عن طريق الفم إعادة الصرف: 0	5000	رفض الإجراء: لا ينطبق تعليمات: لا ينطبق	لا ينطبق

التعديل على الوصفات المسجلة:

تسمح هذه الخاصية للأطباء بتعديل الوصفات الطبية السابقة التي وصفها نفس الطبيب فقط
ملاحظات هامة:

- لن يكون خيار التعديل ممكنًا إذا كانت الوصفة الطبية:
 - مصروفة بالكامل
 - ملغاة
 - منتهية الصلاحية.
 - محظورة
- لن يؤدي التعديل على الوصفات المسجلة إلى إلغاء الوصفة الطبية بعد الآن ، بل سيتم التعديل مع الاحتفاظ بالوصفة الطبية بنفس المرجع ومعرف الوصفة الطبية.
- لن يتم قبول التعديل إلا إذا كانت الوصفة الطبية لا تزال سارية ولم يتم صرفها بالكامل.
- يمكن أن يتيح لك استخدام التعديل إضافة أدوية جديدة إلى الوصفة الطبية أو التعديل على الأدوية الموصوفه في الوصفة الطبية إذا لم يتم صرف الأدوية أو صرفها جزئيًا.
- إذا تم صرف دواء / تم صرفه جزئيًا ولكن يحتوي على تكرارات صرف وحاولت تعديله ، فسيتم تطبيق التعديل على الطلب التالي للدواء.
- بعد تعديل الدواء الموصوف مسبقا ، سيظهر علامة "معدل" تحت الدواء المعدل. يمكنك إزالة التعديل المطبق من خلال النقر على علامة X الخاصة بإشارة **معدل**.

- إذا قمت بإضافة دواء إلى وصفة طبية معدلة ، فسوف تظهر علامة "جديد" تحت الدواء المضاف.

الأدوية (2)

اسم الدواء المسمى
اختر الدواء

تعليقات

تعليقات خافتة

مد (ات) ، مرة (ات) ، موعد الجرعة ، كل ، لمدة ، يوم (أيام) ، طريقة تناول ، عن طريق ، تكرار صرف الدواء ، مرة (ات) ،

عند اللزوم الكمية 0 (ات)

دواعي الاستخدام

إضافة

الدواء	المدة	مجموع الكم	طريقة تناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	حالة الصرف	الخيارات
paracetamol 500 mg Tablets (ORAL Code: 106601-112-074)	30 يوم (أيام)	30000.00	ORAL	Take 500 MG(s) ORAL, 2 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 30 Day(s) تناول 500 ميلليجرام عن طريق الفم، 2 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 30 يوم (أيام).	2	لا ينطبق	لا ينطبق	✕
losartan potassium 50 mg Film coated Tablets (ORAL Code: 155401-032-074)	22 يوم (أيام)	550.00	ORAL	Take 25 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 22 Day(s) تناول 25 ميلليجرام عن طريق الفم، 1 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 22 يوم (أيام).	0	لا ينطبق	لا ينطبق	✕

تعليمات الطبيب:

تدرج الجرعة لنفس المدة / لمدة متتالية:

- يجب أن تكون كل تعليمات في سطر منفصل ، سطر جديد بعد "و" أو "ثم".
- إذا كانت التعليمات غير مناسبة على الملصق ، يجب الاستمرار في التسمية الثانية
- الدواء والرمز العام يجب إزالته من جميع الملصقات
- اختيار البديل الذي سيتم تمكينه لتقليل الجرعة

تدرج الجرعة لنفس المدة:

قد يحتاج الطبيب إلى إضافة جرعة إضافية بتواتر مختلف إلى الدواء الذي يجب تناوله خليل نفس فترة الجرعة الأولى. أي أن المريض سيأخذ الأدوية في وقت واحد مع اتباع التعليمات لكل جرعة على حدة.

الخطوة 1: انقر فوق إضافة جرعة.

نفس المدة

الخطوة 2: حدد نفس المدة

الخطوة 3: أضف التعليمات الخاصة بالجرعة الإضافية.

ستعرض التعليمات الآن الدواء ، مع بدء الجرعة الإضافية على سطر جديد يبدأ بـ "و".

الدواء	المدة	مجموع الكم	طريقة تناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	حالة الصرف	الخيارات
paracetamol 100 mg/ml Drops (solution) (ORAL Code: 106603-332-074)	30 يوم (أيام)	3600	ORAL	Take 10 MG(s) ORAL, 1 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 30 Day(s). AND Take 10 MG(s) ORAL, 11 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 30 Day(s). تناول 10 ميلليجرام عن طريق الفم، 1 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 30 يوم (أيام). و تناول 10 ميلليجرام عن طريق الفم، 11 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 30 يوم (أيام).	0	لا ينطبق	لا ينطبق	✕

تدرج الجرعة لمدة متتالية:

قد يحتاج الطبيب إلى إضافة جرعة إضافية بتواتر مختلف إلى الدواء ، والتي يجب تناولها بعد انتهاء المدة المحددة للدواء الأول. أي أن المريض يأخذ الأدوية الموصوفة على التوالي ، مع اتباع التعليمات الخاصة بكل دواء على حدة.

الخطوة 1: انقر فوق إضافة جرعة.

نفس المدة

الخطوة 2: تأكد من عدم تحديد نفس المدة.

الخطوة 3: أضف تعليمات الدواء الإضافي.

ستعرض التعليمات الآن الدواء , مع بدء الجرعة الإضافية في سطر جديد يبدأ بـ "ثم"

الدواء	المدة	مجموع الكمية	طريقة تناول	تعليمات	إعادة الصرف	دواعي الاستخدام	الخيارات
paracetamol 100 mg/ml Drops (solution) [ORRL] Code: 106803-332-074	20 (يوم (أيام))	1200	ORRL	Take 10 MG(s) ORRL, 1 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 10 Day(s). THEN Take 10 MG(s) ORRL, 11 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 10 Day(s). تناول 10 ميلليجرام عن طريق الفم, مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 10 يوم (أيام). ثم تناول 10 ميلليجرام عن طريق الفم, 11 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 10 يوم (أيام).	0	لا ينطبق	<input type="checkbox"/>

تكرار النمط:

عند إضافة تعليمات الدواء في الوصفة الطبية , يمكنك إضافة نمط متكرر إلى مدة الساعات/الأيام / الأسابيع / الشهر.

عند اللزوم:

خاصية عند اللزوم هي للإشارة إلى أن الدواء موصوف للمريض ولكن ليس من الضروري استخدامه, بل يجب استخدامه فقط إذا لزم الأمر.

- إختيار إشارة عند اللزوم تؤدي إلى إلغاء خاصية تكرار الصرف للدواء.
- الأدوية الموصوفة بإشارة عند اللزوم يمكن للصيديات صرف نصف كميته فقط للمريض عند الطلب.

الادوية (0)

اسم الدواء الملقى

paracetamol 100 mg Rectal suppositories [RECTRL] Code: 106815-223-088

تعليمات

تعليمات خفية

إدخال: 50 ميلليجرام(ات), 1 مرة (ات), موعد الجرعة كل 30 يوم, لمدة 0 يوم (أيام), طريقة التناول, عن طريق, تكرار صرف الدواء, 0 مرة (ات), إضافة جرعة +

تعليمات: عند اللزوم

إزالة رمز الدواء التجاري و العلمي من ملصق الدواء:

يُظهر الملصق الحقول أدناه المتعلقة بالدواء:

- الاسم التجاري للدواء
- الاسم العلمي
- التعليمات

الرموز التجارية والرموز العلمية غير متوفرة على الملصق.

اسم المستشفى: Test Wasfaty Patient	اسم المنشأة: العقربية بالخبر	اسم الطبيب: رامي	رقم الملف: 1234567890
الصيدلي: رامي	الصيدلية: العقربية بالخبر	رقم الوصفة: i3468116	تاريخ الصرف: 31/03/2021 15:30:43
اسم الدواء التجاري:	fevadol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) (oral) 145ML, BOTTLE PACK, SPIMACO- KSA		
اسم الدواء العلمي:	[paracetamol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) [ORAL		
الإرشادات:	تناول 0.03 مليليتراً ملل عن طريق الفم، 2 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 22 يوم (أيام).		
 وصفتي wasfaty			

ملصق الملصق:

إذا أضاف الطبيب تعليمات تتجاوز عدد الأحرف المسموح به لملصق واحدة , فستتم إضافة الإرشادات إلى ملصق آخر يعرض نفس اسم المريض ورقم الملف وسيتم ترقيمها على أنها ملصق 2 .

اسم المستشفى: Test Wasfaty Patient	اسم المنشأة: العقربية بالخبر	اسم الطبيب: رامي	رقم الملف: 1234567890
الصيدلي: رامي	الصيدلية: العقربية بالخبر	رقم الوصفة: i2488518	تاريخ الصرف: لا ينطبق
اسم الدواء التجاري:	Fevadol 500 mg Tablets (oral) 20'S, BLISTER PACK, SPIMACO- KSA		
اسم الدواء العلمي:	[paracetamol 500 mg Tablets [ORAL		
الإرشادات:	تناول 0.5 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 22 يوم (أيام) ثم تناول 0.5 قرص عن طريق الفم، 2 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم (أيام) ثم تناول 0.5 قرص عن طريق الفم، 3 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 2 يوم (أيام).		
 وصفتي wasfaty			

اسم المستشفى: Test Wasfaty Patient	رقم الملف: 1234567890	اسم الدواء العلمي:	[paracetamol 500 mg Tablets [ORAL
		الإرشادات:	ثم تناول 0.5 قرص عن طريق الفم، 1 مرة (ات) الآن كل 1 يوم (أيام) لمدة 1 يوم (أيام).
 وصفتي wasfaty			

توقيت الجرعات:

أثناء إضافة تعليمات الدواء في الوصفة الطبية، قد يختار الطبيب من القائمة المحدثة لتوقيت الجرعات.

موعد الجرعة

البحث في الخيارات

الآن

وقت الظهيرة

قبل الإفطار

قبل الطعام

بنصف ساعة

لا يمكن التطبيق

بعد العشاء

قبل الأكل

بعد الغداء

قبل الغداء

قبل العشاء

اختيار دواء بديل للجرعات التدريجية:

اختيار دواء بديل أصبح ممكناً للأدوية ذات الجرعات المتدرجة تم تطبيق تحديث للسماح باختيار الأدوية البديلة أثناء صرف الأدوية بجرعات متدنية الخطوة 1: تحميل الوصفة الطبية من الصيدلي.

الخطوة 2: تحديد الدواء

الخطوة 3: حدد إظهار الدواء البديل

الخطوة 4: حدد البديل المطلوب.الخطوة

الاسم العلمي للدواء: X
106614-248-074

الرجاء اختيار الدواء التحارشي: ⚠

اختر الدواء

أظهار الدواء البديل

fevodol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) [oral]
145ML, BOTTLE PACK, SPIMACO- KSA Code: 0002-106614-24801

fevodol 500 mg Tablets [oral]
S, BLISTER PACK, SPIMACO- KSA Code: 0002-106601-1170120

tylenol forte 500 mg Tablets [oral]
S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0097-106601-1170120

اختر الدواء



For a good experience with Wasfaty service, we recommend you use the latest versions of these browsers) Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox (taking into consideration that internet explorer browser is not fully supported by Microsoft anymore.

Main Changes:

Prescription List

Show Prescription History:

Prescription history is a function that can be used by the Physician to see all Prescriptions for the patients across all facilities and view their details.

- Step 1: Select **Show Prescription History**
- Step 2: Navigate to **Date search**, which can be found directly available above the list, and filter by entering a date range to search between (From and To).

Note: The "To date" will be populated default from the system as today's date and the "From date" will be populated as 1 month before the system date

Physician Orders ▶ New Prescription

Test Wasfaty Patient Show Active Drugs Update Patient **Hide Prescriptions History**

Document ID: 1234567800
Contact Number: 0587654323
Age: 22 years (Date Of Birth: 28/05/1998)

Gender: Male
Weight (Kg): Height (cm):

Allergies:

Description	Code
112 - penicillins	112

Chronic Diseases:

Description	Code
UB2.3 - Hypertension	UB2.3

Prescriptions History

SEARCH

Date: 27/03/2021 → 27/04/2021

Electronic Prescription Paper Prescription

Search

Physician Name	Prescription Date	Ref. #	Prescription Status	Dispense Status	Options
Rami	31/03/2021 15:29	i3468116	Approved	Dispensed	<input type="button" value=""/>
Rami	29/03/2021 14:36	i0905075	Expired	Not Dispensed	<input type="button" value=""/>

- Step 3: It is important to note that the defaulted returned prescriptions are "Electronic prescription"; incase the end user requires the "paper prescription", they can utilize the radio button in the patient history section.

Dispense Status


In the Prescriptions list, the Physician can see the **Dispense Status** of prescriptions issued by any Physician for a patient as required i.e. whether each prescription is Dispensed, partially dispensed, or Not dispensed.

View Dispense Status in List

The dispense status of a transaction is viewable in the Physician Orders grid, however the Physician must **Click** on the refresh status button in the Transaction Options.

Important Note:

- Refresh status button will disappear if the prescription is fully dispensed, Cancelled, Expired or blocked, but the status will still appear.




Search by Dispense Status

In the **Search**, the Physician can filter transactions using the newly added search field for the dispenses status.

Step 1: Click on Dispense Status

Step 2: Select from drop-down list

- Dispensed
- Partially Dispensed
- Not dispensed



Cancel Prescription



Cancel prescription is a function that allows the Physician to cancel existing **active** prescriptions issued by any other Physician for a patient as required.

Step 1: Select Cancel Prescription

Step 2: To retrieve the prescription information, the following fields are required:

- Patient Identifier

- Document ID




- Iqama Number

- Contact Number

- Prescription Reference Number

- Step 3: After adding the required information, click on **Get Prescription**.

- Step 4: Add the reason of cancellation.



Edit existing Prescriptions

This functionality will allow the Physicians to edit the previous prescriptions prescribed by the same physician only

Important Notes:

- Edit option won't be possible if the prescription is:
 - Fully dispensed
 - Cancelled
 - Expired.

Physician Orders > Edit Prescription

Patient Name: Test Wasfaty Patient Document ID: 1234567800 Contact Number: 0587654323 Show Active Drugs Update Patient Show Prescription History

• Drugs (2)

Drug Generic Name
Select Drug

Instructions

Take (s) Time(s) Dose Timing Every 1 For Day(s) Route of Admin: ORAL Refill this for 0 more time(s) Add Dose

PRN As needed Total Quantity: 0 (s)

Indications

Drug	Duration	Total QTY	Route of Admin	Instructions	Refills	Indications	Dispense Status	Options
paracetamol 500 mg Tablets [ORAL] Code: 106601-117-074 Edited	30 (Day(s))	22500.00	ORAL	Take 750 MG(s) ORAL 1 Time(s) Now Every 1 Day(s) For 30 Day(s). تناول 750 ملليجرام عن طريق الفم مرة (ات) الآن كل 1 يوم (يوم) لمدة 30 يوم (أي).	0	N/A	Not Dispensed	X
losartan potassium 50 mg Film coated tablets [ORAL] Code: 155401-039-074 New	1 (Day(s))	50.00	ORAL	Take 50 MG(s) ORAL 1 Time(s) Now Every 2 Day(s) For 1 Day(s). تناول 50 ملليجرام عن طريق الفم مرة (ات) الآن كل 2 يوم (يوم) لمدة 1 يوم (أي).	0	N/A	N/A	

- Blocked
- Edit existing prescription function won't cancel the prescription anymore, it will edit keeping the prescription with the same Reference and Prescription ID's.
- Edit will only be accepted if the prescription is still valid and not totally consumed.
- Using the edit function can let you add new medications to the prescription or edit from the existing medications of the prescription if the medications are not dispensed or partially dispensed.
- If a medication is dispensed/Partially dispensed but has refills and you tried editing it, the edit will apply on the next request for the medication.
- After editing an existing medication, it will show a tag of **Edited** under the edited medication.
 - You may remove the edit applied by clicking on the **X** sign of the edit flag.
- If a medication is added to an edited prescription, it will show a tag of **New** under the added medication.

Drug Instructions

Tapering Dose for same / different duration


1. Each instruction should be in separate line, new line after "And" or "Then".

2. If the instruction is not fit in the label to be continued in a second label
3. Drug and generic code should be removed for all labels
4. Selecting alternative to be enabled for tapering dose



Tapering Dose - AND

The Physician may need to add an additional dose with different frequency to the drug, which is to be taken during the same period as the first dose. i.e. the patient will take the drugs simultaneously, while following the instructions for each dose separately.

- Step 1: Click **Add Dose**.
- Step 2: Select **Same Duration**
- Step 3: Add instructions for the additional dose.



The instructions will now display the drug, with the additional dose starting on a new line beginning with **“AND”**.



Drug	Duration	Total QTY	Route of A...	Instructions	Refills	Indications	Options
paracetamol 500 mg Tablets [ORAL] Code: 106601-117-074	5 (Day(s))	18750	ORAL	Take 1000 MG(s) ORAL, 3 Time(s) In the Afternoon Every 1 Day(s) For 5 Day(s). AND Take 250 MG(s) ORAL, 3 Time(s) Every 1 Day(s) For 5 Day(s). تناول 1000 ميليغرام عن طريق الفم، 3 مرة (ات) وقت الظهيرة كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم (أيام). و تناول 250 ميليغرام عن طريق الفم، 3 مرة (ات) كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم (أيام).	0	N/A	 

Tapering Dose - THEN

The Physician may need to add an additional dose with different frequency to the drug, which is to be taken **after** the prescribed duration of the first drug has been completed. i.e. the patient will take the prescribed drugs consecutively, while following the instructions for each drug separately.

- Step 1: Click **Add Dose**.
- Step 2: Ensure Same Duration is not selected.
- Step 3: Add instructions for the additional drug.

The instructions will now display the drug, with the additional dose starting on a new line beginning with **“THEN”**

Drug	Duration	Total QTY	Route of A...	Instructions	Refills	Indications	Options
paracetamol 500 mg Tablets [ORAL] Code: 106601-117-074	8 (Day(s))	17250	ORAL	Take 1000 MG(s) ORAL, 3 Time(s) In the Afternoon Every 1 Day(s) For 5 Day(s). THEN Take 250 MG(s) ORAL, 3 Time(s) Every 1 Day(s) For 3 Day(s). تناول 1000 ميلليجرام عن طريق الفم، 3 مرة (ات) وقت الظهيرة كل 1 يوم (أيام) لمدة 5 يوم (أيام). ثم تناول 250 ميلليجرام عن طريق الفم، 3 مرة (ات) كل 1 يوم (أيام) لمدة 3 يوم (أيام).	0	N/A	 

Repeat Pattern

While adding a medication instruction in a prescription, the Physician may add a repeat pattern to the duration of the Hour/Day/Week/Month.

PRN (As Needed)

“Pro Re Nata” function is a flag to indicate that the drug is prescribed to the patient but not a must to be used, but rather just to be used if needed.

1. Selecting the PRN for drug will disable the refills options from the medication.
2. For drugs prescribed as PRN, a pharmacist will only be permitted to dispense only half of the prescribed amount.

Removal of Drug Code and Generic Code from Label



The label shows the below fields relating to the drug:


- Trade Drug Name
- Generic Name
- Instructions

Drug and generic codes are not available on the label.


Drugs (0)

Drug Generic Name
paracetamol 500 mg Tablets [ORAL] Code: 106601-117-074

Instructions   [Special Instructions](#)



Take 250 MG(s), 2 Time(s) In the After... Even  Week For 4 Week(s), Route of Admin: ORAL, Refill this for 0 more time(s) + Add Dose

PRN: As needed Total Quantity: NaN MG(s)

Patient: Rawan test Test		Facility Name: Al-Aqrabiyah Khobar	Label: 1
File No.: 7564586		Physician: Rami	
Pharmacist: Rami		Pharmacy: Al-Aqrabiyah Khobar	
Dispensing Date: 18/05/2021 13:29:47		eRx Number: 2343243	
Trade Drug Name:	daivonex 50 mcg/g Ointment [topical] 30G, TUBE PACK, ALNAGHI COMPANY- KSA		
Generic Name:	calcipotriol 50 mcg/g Ointment [TOPICAL]		
Instructions:	Apply 1 TUBE(s) TOPICAL, 1 Time(s) Every 1 Day(s) For 1 Day(s). THEN Apply 1 TUBE(s) TOPICAL, 1 Time(s) Every 1 Day(s) For 1 Day(s).		
 920000932 Keep out of reach of children			

Label Extension

If the Physician adds instructions that exceed the permitted character count for 1 label, the instructions will be added to a second label displaying the same **Patient name** and **File No** and will be numbered as **Label 2**


Patient: Rawan test Test		Facility Name: Al-Aqrabiyah Khobar	Label: 1
File No.: 7564586		Physician: Rami	
Pharmacist: Rami		Pharmacy: Al-Aqrabiyah Khobar	
Dispensing Date: N/A		eRx Number: i6388078	
Trade Drug Name:	fevadol 500 mg Tablets [oral] 20'S, BLISTER PACK, SPIMACO- KSA		
Generic Name:	paracetamol 500 mg Tablets [ORAL]		
Instructions:	Take 2 TABLET(s) ORAL, 2 Time(s) Before Breakfast Every 1 Week(s) For 2 Week(s). AND Take 0.5 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) In the Afternoon Every 1 Week(s) For 2 Week(s). AND Take 0.5 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) Now Every 1 Week(s) For 2		
 920000932 Keep out of reach of children			
Patient: Rawan test Test		File No.: 7564586	Label: 2
Generic Name:		paracetamol 500 mg Tablets [ORAL]	
Instructions:		AND Take 0.5 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) Before Meals Every 1 Week(s) For 2 Week(s). AND Take 0.5 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) After Supper meal Every 1 Week(s) For 2 Week(s). AND Take 0.5 TABLET(s) ORAL, 1 Time(s) 30 Minutes Before Meals Every 1 Week(s) For 2 Week(s).	
 920000932 Keep out of reach of children			

Selecting Alternative Drug enabled for Tapering Dose

An update has been applied to allow the Physician to view alternative drugs while tapering.

The Physician may need to add an additional dose to the drug of the prescription, which is to be taken **during** or **after** the prescribed duration of the first dose has been completed.

- Step 1: Click **Add Dose**.
- Step 2: Select **Same Period** if drug is to be taken **during** the same duration, alternatively ensure that it is not selected if the drug is to be take **after**.
- Step 3: Click **Select Drug**
- Step 4: Select **Show Alternative Drug**
- Step 5: Select required alternative.



Select Drug..

Show Alternative Drug


fevadol 160 mg/5ml Syrup (sugar free) [oral]
145ML, BOTTLE PACK, SPIMACO- KSA Code: 0002-106614-24801

fevadol 500 mg Tablets [oral]
20'S, BLISTER PACK, SPIMACO- KSA Code: 0002-106601-11701

tylenol forte 500 mg Tablets [oral]
20'S, BLISTER PACK, ALTERNATIVE Code: 0097-106601-11701

Updated Dose Timing

While adding a medication instruction in a prescription, the Physician may select from the newly updated list of Dose Timings.



(s) Dose Timing

Filter the options

Now

In the Afternoon

Before Breakfast

30 Minutes Before Meals

Not Applicable

After Dinner

Before Meals

After Lunch

Before Lunch

Before Dinner

After Breakfast

2 Hours After Meal

Help and Support
92 0000 932
www.wasfaty.sa
📺 🐦 wasfaty_sa



 وفتي
wasfaty

Best Browsers to use the platform: Firefox  Google Chrome  Microsoft Edge 