

Aldara™ 5% cream

Imiquimod

<p>Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine.</p> <ul style="list-style-type: none">Keep this leaflet. You may need to read it again. If you have any further questions, please ask your doctor or your pharmacist. This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What Aldara cream is and what it is used for
- Before you use Aldara cream
- How to use Aldara cream
- Possible side effects
- How to store Aldara cream
- Further information

1. WHAT IS ALDARA CREAM AND WHAT IT IS USED FOR

Aldara cream may be used for three different conditions. Your doctor may prescribe Aldara cream for the treatment of:

- Warts (condylomata acuminata) on the surface of the genitals (sexual organs) and around the anus (back passage)
- Superficial basal cell carcinoma.
 - This is a common slow-growing form of skin cancer with a very small likelihood of spread to other parts of the body. It usually occurs in middle-aged and elderly people, especially those who are fair-skinned and is caused by too much sun exposure. If left untreated, basal cell carcinoma can disfigure, especially on the face – therefore early recognition and treatment are important.
- Actinic keratoses
 - Actinic keratoses are rough areas of skin found in people who have been exposed to a lot of sunshine over the course of their lifetime. Some are skin coloured, others are greyish, pink, red or brown. They can be flat and scaly, or raised, rough, hard and warty. Aldara should only be used for flat actinic keratoses on the face and scalp in patients with a healthy immune system where your doctor has decided that Aldara is the most appropriate treatment for you.

Aldara cream helps your body’s own immune system to produce natural substances which help fight your basal cell carcinoma, actinic keratosis or the virus that has caused your warts.

- ### 2. BEFORE YOU USE ALDARA CREAM
- Do not use Aldara cream:**
- If you are allergic to imiquimod (the active ingredient) or any of the ingredients of the cream.

Take special care with Aldara cream:

- If you have previously used Aldara cream or other similar preparations tell your doctor before starting this treatment.
- Tell your doctor if you have problems with your immune system.
- Do not use Aldara cream until the area to be treated has healed after previous drug or surgical treatment.
- Avoid contact with the eyes, lips and nostrils. In the event of accidental contact, remove cream by rinsing with water.
- Do not apply the cream internally.
- Do not use more cream than your doctor has advised.
- Do not cover the treated area with bandages or other dressings after you have applied Aldara cream.
- If the treated site becomes too uncomfortable, wash the cream off with mild soap and water. As soon as the problem has stopped you may restart to apply the cream.
- Tell your doctor if you have an abnormal blood count.

Because of the way Aldara works, there is a possibility that the cream may worsen existing inflammation in the treatment area.

- If you are being treated for genital warts follow these additional precautions:
 - Men with warts under the foreskin should pull the foreskin back each day and wash underneath it. If not washed daily the foreskin may be more likely to show signs of tightness, swelling and wearing away of the skin and result in difficulty in pulling it back. If these symptoms occur, stop the treatment immediately and call your doctor.
 - If you have open sores: do not start using Aldara cream until after the sores have healed. If you have internal warts: do not use Aldara cream in the urethra (the hole from which urine is passed), the vagina (birth canal), the cervix (internal female organ), or anywhere inside your anus (rectum).
 - Do not use this medication for more than one course if you have problems with your immune system, either due to illness or because of the medicines you are already taking. If you think this applies to you talk to your doctor.
 - If you are HIV positive you should inform your doctor as Aldara cream has not been shown to be as effective in HIV positive patients. If you decide to have sexual relations while you still have warts, apply Aldara cream after - not before - sexual activity. Aldara cream may weaken condoms and diaphragms, therefore the cream should not be left on during sexual activity. Remember, Aldara cream does not protect against giving HIV or other sexually transmitted diseases to someone else.
- If you are being treated for basal cell carcinoma or actinic keratosis follow these additional precautions:
 - Do not use sunlamps or tanning beds, and avoid sunlight as much as possible during treatment with Aldara cream. Wear protective clothing and wide brimmed hats when outdoors.

Whilst using Aldara cream and until healed, the treatment area is likely to appear noticeably different from normal skin.

Using other medicines:

Please inform your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including those obtained without a prescription.

There are no medicines known to be incompatible with Aldara cream.

Pregnancy and breast-feeding:

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

You must tell your doctor if you are pregnant or intend to become pregnant. Your doctor will discuss the risks and benefits of using Aldara cream during pregnancy. Studies in animals do not indicate direct or indirect harmful effects in pregnancy. Do not breast-feed your infant during treatment with Aldara cream, as it is not known whether imiquimod is secreted in human milk.

Important information about some of the ingredients of Aldara cream:
Methyl hydroxybenzoate (E218) and propyl hydroxybenzoate (E216) may cause allergic reactions (possibly delayed). Cetyl and stearyl alcohol may cause local skin reactions (e.g. contact dermatitis).

3. HOW TO USE ALDARA CREAM

Always use Aldara cream exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Wash hands carefully before and after applying the cream. Do not cover the treated area with bandages or other dressings after you have applied Aldara cream.

Open a new sachet each time you use the cream. Dispose of any cream left in the sachet after use.

Do not save the opened sachet for use at a later date.

The treatment frequency and duration differ for genital warts, basal cell carcinoma and actinic keratosis (see specific instructions for each indication).

Aldara Cream Application Instructions		

- If you are being treated for genital warts:**

Application Instructions – (Mon, Wed and Fri)

- Before going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Open a new sachet and squeeze some cream onto your fingertip.
- Apply a thin layer of Aldara cream onto clean, dry wart area and rub gently into the skin until cream vanishes.
- After application of the cream, throw away the opened sachet and wash hands with soap and water.
- Leave Aldara cream on the warts for 6 to 10 hours. Do not shower or bathe during this time.
- After 6 to 10 hours wash the area where Aldara cream was applied with mild soap and water.

Apply Aldara cream 3 times per week. For example, apply the cream on Monday, Wednesday and Friday. One sachet contains enough cream to cover a wart area of 20 cm2 (approx. 3 square inches). Men with warts under the foreskin should pull the foreskin back each day and wash underneath it (see section 2 “Take special care with Aldara cream.”)

Continue to use Aldara cream as instructed until your warts have completely gone (half the females who clear will do so in 8 weeks, half the males who clear will do so in 12 weeks but in some patients warts may clear as early as 4 weeks). Do not use Aldara cream for more than 16 weeks in the treatment of each episode of warts. If you have the impression that the effect of Aldara cream is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

- If you are being treated for basal cell carcinoma:**

Application Instructions – (Mon, Tues, Wed, Thurs and Fri)

- Before going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Open a new sachet and squeeze some cream onto your fingertip.
- Apply Aldara cream to the affected area and 1cm (approx. 0.5 inch) around the affected area. Rub gently into the skin until the cream vanishes.
- After application of the cream, throw away the opened sachet. Wash hands with soap and water.
- Leave Aldara cream on the skin for about 8 hours. Do not shower or bathe during this time.
- After about 8 hours, wash the area where Aldara cream was applied with mild soap and water.

Apply sufficient Aldara cream to cover the treatment area and 1 cm (about ½ an inch) around the treatment area each day for 5 consecutive days each week for 6 weeks. For example, apply the cream from Monday to Friday. Do not apply the cream on Saturday and Sunday.

- If you are being treated for actinic keratosis**

Application Instructions – (Mon, Wed and Fri)

- Before going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Open a new sachet and squeeze some cream onto your fingertip.
- Apply the cream to the affected area. Rub gently into the area until the cream vanishes.
- After application of the cream, throw away the opened sachet. Wash hands with soap and water.
- Leave Aldara cream on the skin for about 8 hours. Do not shower or bathe during this time.
- After about 8 hours, wash the area where Aldara cream was applied with mild soap and water.

Apply Aldara cream 3 times per week. For example, apply the cream on Monday, Wednesday and Friday. One sachet contains enough cream to cover an area of 25 cm2 (approx. 4 square inches). Continue treatment for four weeks. Four weeks after finishing this first treatment, your doctor will assess your skin. If the lesions have not all disappeared, a further four weeks of treatment may be necessary.

If you use more Aldara cream than you should:

Wash the extra away with mild soap and water. When any skin reaction has gone you may then continue with your treatment.

If you accidentally swallow Aldara cream please contact your doctor.

If you forget to use Aldara cream:

If you miss a dose, apply cream as soon as you remember and then continue in your regular schedule.

Do not apply the cream more than once per day.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

The frequency of side effects is classified as follows:

Very common side effects (likely to occur in more than 1 in 10 patients)

Common side effects (likely to occur in fewer than 1 in 10 patients)

Uncommon side effects (likely to occur in fewer than 1 in 100 patients)

Rare side effects (likely to occur in fewer than 1 in 1,000 patients)

Very rare side effects (likely to occur in fewer than 1 in 10,000 patients).

Like all medicines, Aldara cream can cause side effects, although not everybody gets them.

Tell your doctor or pharmacist as soon as possible if you do not feel well while you are using Aldara cream.

Some patients have experienced changes in skin colour in the area where Aldara cream was applied. While these changes have tended to improve with time, in some patients they may be permanent. If your skin reacts badly when using Aldara cream, stop applying the cream, wash the area with mild soap and water and contact your doctor or pharmacist.

In some individuals a lowering of blood counts was noted. A lowering of blood counts might make you more susceptible to infections, make you bruise more easily or cause fatigue. If you notice any of these symptoms, tell your doctor.

Serious skin reactions have been reported rarely. If you experience skin lesions or spots on your skin that start out as small red areas and progress to look like mini targets, possibly with symptoms such as itching, fever, overall ill feeling, achy joints, vision problems, burning, painful or itchy eyes and mouth sores, stop using Aldara cream and tell your doctor immediately.

A small number of patients have experienced hair loss at the treatment site or surrounding area. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not mentioned in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

- If you are being treated for genital warts:**

Many of the undesirable effects of Aldara cream are due to its local action on your skin.

Very common effects include redness (61% patients), wearing away of the skin (30% patients), flakiness and swelling. Hardening under the skin, small open sores, a crust that forms during healing, and small bubbles under the skin may also occur. You might also feel itching (32% patients), a burning sensation (26% patients) or pain in areas where you have applied Aldara cream (8% patients). Most of these skin reactions are mild and the skin will return to normal within about 2 weeks after stopping treatment.

Commonly some patients (4% or less) have experienced headache, **uncommonly** fevers and flu like symptoms joint and muscle pains; prolapse of the womb; pain on intercourse in females; erection difficulties; increase in sweating; feeling sick; stomach and bowel symptoms; ringing in the ears; flushing; tiredness; dizziness; migraine; pins and needles; insomnia; depression; loss of appetite; swollen glands; bacterial, viral and fungal infections (e.g. cold sores); vaginal infection including thrush; cough and colds with sore throat.

Very rarely severe and painful reactions have occurred, particularly when more cream has been used than recommended. Painful skin reactions at the opening of the vagina have very rarely made it difficult for some women to pass urine. If this occurs you should seek medical help immediately.

- If you are being treated for basal cell carcinoma:**

Many of the undesirable effects of Aldara cream are due to its local action on your skin. Local skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.

Very Commonly the treated skin may be slightly itchy.

Common effects include: pins and needles, small swollen areas in the skin, pain, burning, irritation, bleeding, redness or rash.

If a skin reaction becomes too uncomfortable during treatment, speak to your doctor. He/she may advise you to stop applying Aldara cream for a few days (i.e. to have a short rest from treatment). If there is pus (matter) or other suggestion of infection, discuss this with your doctor. Apart from reactions in the skin, other common effects include swollen glands and back pain.

Uncommonly some patients experience changes at the application site (discharge, inflammation, swelling, scabbing, skin breakdown, blisters, dermatitis) or irritability, feeling sick, dry mouth, flu-like symptoms and tiredness.

- If you are being treated for actinic keratosis**

Many of the undesirable effects of Aldara cream are due to its local action on your skin. Local skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.

Very commonly the treated skin may be slightly itchy.

Common effects include pain, burning, irritation or redness.

If a skin reaction becomes too uncomfortable during treatment, speak to your doctor. He/she may advise you to stop applying Aldara cream for a few days (i.e. to have a short rest from treatment). If there is pus (matter) or other suggestion of infection, discuss this with your doctor. Apart from reactions in the skin, other common effects include headache, anorexia, nausea, muscle pain, joint pain and tiredness.

Uncommonly some patients experience changes at the application site (bleeding, inflammation, discharge, sensitivity, swelling, small swollen areas in the skin, pins and needles, scabbing, scarring, ulceration or a feeling of warmth or discomfort), or inflammation of the lining of the nose, stuffy nose, flu or flu-like symptoms, depression, eye irritation, swelling of the eyelid, throat pain, diarrhoea, actinic keratosis, redness, swelling of the face, ulcers, pain in extremity, fever, weakness or shivering.

5. HOW TO STORE ALDARA CREAM

Keep out of the reach and sight of children.

Do not store above 25°C.

Do not use after the expiry date stated on the label.

Sachets should not be re-used once opened.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION

What Aldara cream contains:

- The active substance is imiquimod. Each sachet contains 250 mg cream (100 mg cream contains 5 mg imiquimod).
- The other ingredients are isotearic acid, benzyl alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol, white soft paraffin, polysorbate 60, sorbitan stearate, glycerol, methyl hydroxybenzoate (E218), propyl hydroxybenzoate (E216), xanthan gum, purified water.

What Aldara cream looks like and contents of the pack:

- Each Aldara 5% cream sachet contains 250 mg of a white to slightly yellow cream.
- Each box contains 12 or 24 single-use polyester/aluminium foil sachets. Not all pack sizes may be marketed.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Germany

MANUFACTURER:

3M Health Care Limited

Derby Road

Loughborough

Leicestershire

LE11 5SF, United Kingdom

This leaflet was last approved in September 2009

<p>This is a medicament</p> <ul style="list-style-type: none">A medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instruction is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks. Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you. Do not repeat the same prescription without consulting your doctor. Keep medicaments out of the reach of children. <p>Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists</p>

620417523

5638967110SA00

Aldara™ 5% cream

Imiquimod

ألدارا™ كريم ٥ ٪

إميكيمود

MEDA

Aldara is a trademark of MEDA AB. The Triangle Logo on the packaging is a trademark of 3M and is used under license.

أَلَدَارا™ كَرِيم ه ٪

إميكيمود

النشرة الدوائية:
معلومات طَبِئِيَّة لمن يَسْتَغْمَلُ مَرْهَمَ السنتضرز الطبي - أَلَدَارا (إيِمِِكُومُود - عيار: ٠75) الكريم تمناعي جلدي موضعي فقط، مُضاد للأورام السرطانية"

<div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>
<div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> </div> <div> <p>*يرجى قراءة هذه النشرة الدوائية بتمعّن، قبل البدء باستعمال هذا الدواء؛ *يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة؛ لرمّا يحتاج إلى إفراغها مرة ثانية. *إذا إردت المزيد من الإستفسار والتوضيح؛ يُرجى استشارة الطبيب المُعالِج، أو الصيدلي المعني بهذا الشأن.</p> <p>لقد تمّ وصف هذا الدواء لك فقط، فلا تدع لأحدٍ أن يستعملوه؛ فقد يؤذيهم ذلك، حتى وإن كانوا يُعانون من ذات الأعراض التي تُعاني منها أنت. *في حالة تزايد خطر أية آثارٍ جانبية، أو عند ملاحظتك لأيّة آثارٍ جانبيةٍ غير مدرجةٍ بهذه النشرة؛ يرجى الإتصال بالطبيب المُعالِج أو الصيدلي المعني بهذا الشأن.</p> </div>

محتويات هذه النشرة الدوائية العلاجية:

١- ما هو مَرْهَمُ (أَلَدَارا)؟ وما دواعي استعماله ؟.

٢- قبل استعمالك لِمْهَمِ (أَلَدَارا).

٣- كيف تَسْتَغْمَلُ مَرْهَمَ (أَلَدَارا).

٤- الآثار الجانبية المحتملة الحدوث، عند استعمالك لِمْهَمِ (أَلَدَارا).

٥- كيف يتم تخزين مَرْهَمِ (أَلَدَارا).

٦-معلومات إضافية.

1)ما هو مَرْهَمِ أَلَدَارا؟ وما دواعي استعماله؟:

يَتِمُّ استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا) لِتُعالِجَ الحالات الثلاث المُختَلِفَةِ التالية، حيث يَصِفُ الطبيب المُعالِج مَرْهَمِ (أَلَدَارا) لِتُعالِجَ ما يلي:-

*** لِمُعالِجَةِ السَّالِبِلِ الورمية التناسلية، التي تتواجد حول سطح الأعضاء التناسلية ومحيط فتحة الشرج.**

*** لِمُعالِجَةِ الخلايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية السطحية القاعدية (الأساسية) التالية؛ والتي هي عبارة عن شكّلٍ شائع من سرطان الجلد طبيي؛ النمو، تنتشر بأحجام صغيرة جداً؛ على أجزاءٍ أُخرى لمسطح الجسم. وتُصيبُ عادةً الأشخاص في سِنِّ (ما بين الأربعين - إلى الستين) من العمر، وفي سِنِّ الكُهولَةِ، خاصَّةً ذوي البَشْرَةِ البيضاء والشفراء؛ إثر تَعْرُضِ أجسادهم لفترات طويلة لأشعة الشمس. وإذا تَرَكْتِ هذه البثور الجلدية دون مُعالِجَةٍ، فمن شأنها أن تُحدِثَ عُدْثًا وَرَثَمِيَّةً سَرَطَانِيَّةً خَبِئَةً، وتَسْهُوَهُ سَطَحَ الجسم، خاصَّةً على الوجه. ولِهَذَا، يَتَحَدَّدُ ضرورةَ، التَعَرُّفِ عليها والكشف عنها ومُعالِجَتُها مُبَكِّرًا.**

*** لِتُعالِجَةِ التقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية، نتيجة التعرض الشديد لأشعة الشمس لفترات طويلة؛**
وإن هذه التقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية، هي عبارة عن: أماكنٍ خَبِئَةٍ ضَلَبَةٌ تقشرية موضعية خارجية في الجلد. تمَّ اكتشافها على الأشخاص الذين تعرضوا أجسادَهُمْ لأشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة خلال حياتهم. وقد وَجِدت بعض جلوبهم مُلَبَّثَةً، والأخرى ضارِبَةً للون الرمادي، أو المُزْرِغَلِي، أو الأحمر، أو البُيِّن. وتتواجد هذه الحراشيف بأشكالٍ مُسَطَّحَةٍ أو ذات فُشُور، أو نافيةٍ، بارزَةٍ، خَبِئَةٍ ضَلَبَةٍ، وقُلوْلِيَّةٍ. لذا، يَتَوَجَّبُ فقط استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا) لحالات العُدْدِ الورمية السرطانية الخبيثة هذه، التي قد تنتشرعلى وجوه وفورات رؤوس الرضى، باعتباره نظام وقائي مناعي وصحي علاجي، حيث الطبيب المُعالِج يكون قد قرر، بأن مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، هو أفضل علاجٍ دوائي مناسبٍ لَتَكَّ في هذا الشأن.

إنَّ مَرْهَمِ (أَلَدَارا) يُساعدُ في تخسين جهازك المناعي، من خلال إفرازه للمواد الطبيعية، التي تُساعدُ في مُكافحةِ كُلِّ من: الخلايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية السطحية القاعدية، أوالتقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية، أو الفيروسات التي تُسَبِّبُ لَتَكَّ السَّالِبِلِ، على سطحِ جَسَدِكَ.
(٢ نصائح وإرشادات قبل استِغْمَالِك لِمْهَمِ (أَلَدَارا):-
*** يتَوَجَّبُ عليك عَدَمَ استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)؟؟ :-**
-إذا كُنْتُ تُعاني من حسّاسيةٍ جَاهِ الـ (إيِمِِكُومُود)المُكوِّنُ الفَعَّالَ لهذا الدواء)، أو من أي من المُكوِّنات الأخرى لهذا المرهم.
*** حالاتٍ يجب أخذها بعين الإعتبار، مع الحيطة والحذر، عند استِغْمَالِك لِمْهَمِ (أَلَدَارا):-**
- إذا سَبِقَ وأنَّ استَعْمَلْتُ مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، أو أي مُسْتَحَصَّرٍ طبيي آخرٍ شبيهه أو مُماثِلٍ، يُرجى اطلاع الطبيب المُعالِج على ذلك، قَبْلَ البدء بهذه المُعالِجَةِ.
- كما يُرجى اطلاع الطبيب المُعالِج، إذا كُنْتُ تُعاني مِن أيِّهِ مُعَضَلاتٍ، في جهازك المناعي.
- وَيُرجى عَدَمَ استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، ريثمًا يتم التنام الموضِعُ المُراد مُعالِجَتِهِ، بعد استعمال الدواء العلاجي السابق، أو المُعالجة الجراحية السابقة.
- يُرجى جَنِّبِ ملامسة هذا المرهم للعيون أو الشفتين أو فتحتي الأنف. وفي حالة ملامسته لهذه الأجزاء، بصفَةِ عَرَضِيَّةٍ طارِئَةٍ، تمم إزالته من خلال غسله برفقٍ بالماء. - يُرجى عدم دَهْنِ أو استعمال هذا المرهم، لأي جزءٍ أو لايَّةٍ عُراضِ داخل الجسم.
- كما يُرجى عدم استعمال أكثر من مرهم، عَمَّا وصفه لك الطبيب المُعالِج.
- يُرجى عدم تغطية الموضع المُراد مُعالِجَتِهِ، بأيَّة لَاقَاتٍ أو ضَمَّاداتٍ أُخرى، بعد دهنها بِمَرْهَمِ (أَلَدَارا).
- إذا أصبحت تُعاني من صَبِغٍ، من الموضعِ المُراد مُعالِجَتِهِ، يُرجى إزالة المرهم، بغسله بالمصابون والماء الخفيف. وعند زوال المضايقة، تمم إعادة دَهْنِ واستعمال المرهم من جديد.
- يُرجى اطلاع الطبيب المُعالِج، إذا كان عدد كَرَّتَاتِ تَوَكِّمٍ غير اعتيادي.

*** نظرًا لطريقة استعمال وتأثير مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، فهناك احتمالية، بأن تسوء حالة الإنتهاب الموجودة، في موضعِ المُعالِجَةِ.**

- إذا كُنْتُ تُعالِجُ نَزالِبِلِ الأعضاء التناسلية بهذا المرهم، نرجو التقيد بالمُحاذِر والتدابير الوقائية الإضافة التالية:-

يتوَجَّبُ على الذكور، سحب المُلقَنَةُ الذَكَرِيَّةِ إلى الخلف يوميًا، وَغَسْلُها ما يَأَسْفُلُها.

حيث إذا لم يتم غسل هذه المُلقَنَةُ الذَكَرِيَّةِ يوميًا، فعلى الأُرجح بأن تُصبح أكثرُ يَسُدَّةً وتضيِّقًا وانتفاخًا وعَرَضَةً لِتَمَرَّقُ الجلد، ممَّا يَنْجُبُ عنه صعوبةٍ سَخِيها إلى الخلف فيما بعد. وفي حالة خُدوث وظهور مثل هذه الأعراض، يُرجى التَوَقُّفِ عن المُعالجة فوراً

، و الإلتصال بالطبيب المُعالِج. وفي حالة خُدوث وظهور تَقَرُّحاتٍ مفتوحة:-

يُرجى عَدَمُ البدء باستعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، ريثما نلتئم هذه التقرحات.

- وإذا كُنْتُ تُعاني من نَزالِبِلِ داخلية:-

يُرجى عَدَمَ استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا) داخل مجرى البول (الإحليل). وبالنسبة للأنثى في هذه الحالة؛ يُرجى عَدَمَ استعماله، داخل المهبل أو عنق الرحم، أو أي موضعٍ داخل فتحة الشرج، لِإِيْتِهَمَا (الذَكَرُ أو الأنثى). يُرجى عَدَمَ استعمال هذا المَرْهَمِ لِأَكثَر من دورةٍ علاجيةٍ، إذا كُنْتُ تُعاني من مشاكلٍ جهازك المناعي؛ فيما إذا كان سَبَبُ ذلك يعود إلى المرض ذاته، أو مرَّتَهُ إلى الأدوية التي تتوَقَّضُ استعمالُها فعليًا. وإذا تَعَسَّفَدُ أن هذه الأعراضُ المُشَارُ إليها تَطَّيَّقُ عليك، يُرجى الإلتصال بالطبيب المُعالِج. وإذا كُنْتُ تُعاني من مرض الإيدز (نقص المناعة المُكتَسَبِيَّة)؛ يَتَوَجَّبُ عليك اطلاع الطبيب المُعالِج على ذلك، حيثُ استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، لا يُحدي نفعًا على مرضي الإيدز. وفي حالة الجِمَاعِ؛ يُرجى استعمال هذا المَرْهَمِ بعد الجماع - وليس قَبْلَهُ -.

وحيث أنَّ مَرْهَمِ (أَلَدَارا) يُضِعِفُ المناعِ والحوارِجِ الواقية للجِمَاعِ؛ لذا يَتَوَجَّبُ عدم إبقائه عند الجِمَاعِ؛ وما جُدُر ملاحظته وتَدَكُّرِهِ، بأنَّ مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، لا يحمي أو يقي أو يمنع من انتقال عدوى مرض الإيدز، أو انتقال عدوى الأمراض الجنسية الأُخرى، من شخصٍ لِأَخرِ.

- إذا كُنْتُ قَيدَ لِتُعالِجَةِ لدخلايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية القاعدية (الأساسية)، أو لِتُعالِجَةِ التقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية، يُرجى اتِّباع المُحاذِر والتدابير الوقائية الإضافية التالية:-

*** عدم استعمال المصابيح والأسيرة الشمسية، ونفاذي التعرض لأشعة الشمس يَقَدَّرِ ما يُكَبِّرُ، خلال فترة المُعالجة بواسطة مَرْهَمِ (أَلَدَارا).**
*** يُرجى إزدياد الألبسة الواقية، والقَبَّعاتُ ذات الحواف العريضة، عندما تكون خارج منزلك.**
*** تَدَكَّرْ، بأنَّه خلال فترة المُعالجة بِمَرْهَمِ (أَلَدَارا) ولغاية حد الشُدء والإلتنام ما كنت تُعاني منه، فإنَّ لون وشكل موضع المُعالجة، يبدو غالبًا مُغايِرَةً ومُختلفَةً بشكلٍ واضح عن الجلد الإعتيادي.**

- عند استعمالك لأدويةٍ أُخرى غير هذا الدواء:-

- إذا كُنْتُ تستعمل بوقتكَ الراهن، أو استعملت حديثًا، أيَّةَ أدويةٍ أُخرى، بما في ذلك الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفٍ طبييِّ؛ يُرجى اطلاع الطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني على ذلك، قبل البدء باستعمال هذا الدواء.
- غير معلوم لغاية الآن، أنَّ هنالك دوائًا يُتعارَضُ مع مَرْهَمِ (أَلَدَارا).
- حالات الحمل والرضاعة:-

-
برجى من المرأة الحامل أو المُرضِعَةُ استشارة الطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني، قبل استعمال أي دواء.
*** كما يَتَوَجَّبُ عليها اطلاع الطبيب المُعالِج، فيما إذا كانت حامِلةً، أو تُريدُ الحَمْلَ.**
*** سيقوم الطبيب المُعالِج، بمناقشة مخاطر وفوائد استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، خلال فترة الحَمْلِ.**
*** ولقد أظهرت التجارب والدراسات على الحيوانات، عدم وجود أية إشاراتٍ مُبَيَّنَة أوغير مُبَيَّنَة، لايَّةِ تأثيراتٍ جانبيةٍ مُؤدِيَةٍ، من جزءِ استعمال هذا المرهم، أثناء فترة الحَمْلِ.**
*** يَتَوَجَّبُ على المرأة المُرضِعَةُ عدم الرضاعةِ، خلال فترة المُعالجة بِمَرْهَمِ (أَلَدَارا)، حيث مِن غير العلوم، فيما إذا يتم إفراز مادة الـ (إيِمِِكُومُود) في حليب المُرضِعَةِ (الذي يستقبل بدوره إلى الرضيع).**
- معلومات هَامَّةٍ حَولَ بعض مُكوِّنات مَرْهَمِ (أَلَدَارا) :-
إنَّ مُكوِّنات: ميتثيل-هايدرو-زاي-بنزوات (E٢١٨) (بنزوات فينول الميتثيل) وبروبيل-هايدرو-زاي بنزوات (E٢١٦) (بنزوات البروبيل)، تُسَبِّبُ حسّاسيةً، كأثارٍ جانبيةٍ سلبيةٍ (ومن المُحتمَّل أن يَحدُثَ ذلك لِأَحْصًا، كما أنَّ: (سينتايل-وسنتيرايِل-الكحول) عطر الكحول والشحمي)، يُسَبِّبان أثارًا جانبيةً سلبيةً، مثل: (الإلتهاب الإحتكاكي الموضعي لبشرة الجلد).

(٣ كيفية استعمال مرهم أَلَدَارا) :-

يُرجى دأئمًا استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، بِيدِجٍ كاملةٍ، طَيِّعًا لتعليمات الطبيب المُعالِجِ، كما حالاتٍ يجب أخذها بعين الإعتبار، مع الحيطة والحذر، عند استِغْمَالِك لِمْهَمِ

• قَمِّ بِغَسْلِ يديكِ يَعايِنَةً كاملةً قبل وبعد استعمالك لهذا المرهم، وعَدَمَ تغطية موضع المُعالجة بأيَّة لَاقَاتٍ أو ضَمَّاداتٍ أُخرى، بعد دهن مَرْهَمِ (أَلَدَارا).
• وقَمِّ كذلك بفتح (عُبُوَّةِ المرهم) في كل مرةٍ تستعمل بها هذا المرهم، والتَّخَلُّصِ من أي مرهمٍ نَمَّ إلفانه في (عُبُوَّةِ المرهم) بعد الإلتعمال، وعدم الإحتفاظ بالسكيسِ المصفوح لِاستعماله لاحقًا .
• إنَّ تَكَرار المُعالجةِ وفترتها الزمنية، تختلف باختلاف مَفِهُدِ المُعالجة، فيما إذا كانت من أجل: مُعالجة ناليل الأعضاء التناسلية، أم لِتُعالِجَةِ الخلايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية القاعدية (الأساسية)، أو لِتُعالِجَةِ التقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية (يُرجى الإطلاع على إرشادات كل حالة استعمال على حدة).

1		2	
3		4	

- إذا كُنْتُ قَيدَ لِتُعالِجَةِ نَزالِبِلِ الأعضاء التناسلية:

- تطبيق خطوات الإرشادات والتعليمات: أيام (الإثنين، الأربعاء والجمعة):-

١) قبل الذهاب إلى السرير: يتم غسل اليدين وموضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء، ثم التجفيف بالكامل.

٢) يتم فتح (عُبُوَّةِ مرهم) جديدة، واستخراج بعض من المرهم على رأس الإصبع.

٣) يتم دهن طبقةٍ رقيقةٍ من المرهم على القُلوْلِ النظيف والجاف، ثم الفرك برفق على الجلد، حتى يتلاشى المرهم.

٤) بعد عملية دهن واستعمال المرهم، يتم طرح (عُبُوَّةِ المرهم) المُستعملة جانبًا، ويعقب ذلك غسل اليدين بالمصابون والماء.

٥) يُتَرَكُ المرهم على الناليل لمدة (٦ - ١٠ ساعات)، مع عدم رش الماء على الجسم أو الإستحمام أو الإغتسال، خلال هذه المدة.

٦) بعد انقضاء مدة الـ (٦ - ١٠ ساعات) المشار إليها، يتم غسل المرهم في موضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء.

• يتم تطبيق استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، ثلاث مراتٍ اسبوعيًا. فعلى سبيل المثال، يتم دهن

المرهم أيَّام (الإثنين، الأربعاء والجمعة) من كل اسبوع .
حتوي كل عُبُوَّةٍ على كميةٍ كافيةٍ من المرهم، تُسَدُّ حاجة مساحة قُلوْلِ قدرها: (٢٠١ سم مربع) أي (ما يعادل ٣ إنشات مربعة)).
• يتوَجَّبُ على الذكور، سحب المُلقَنَةُ الذَكَرِيَّةِ إلى الخلف يوميًا، وَغَسْلُها ما يَأَسْفُلُها (يُرجى النظر إلى الفقرة رقم: ٢ "إتخاذ العناية الخاصة، عند استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)".).

• يتوجب متابعة استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، طبقًا للتعليمات والإرشادات، ريثما يتم اختفاء الناليل بالكامل: (لقد اخفقت ناليل نصف المصابات من النساء بهذه الآفة، في غضون (٨) أسابيع من المُعالجة، واخفخت ناليل نصف المصابين من الرجال خلال (١٢) أسبوعًا من المُعالجة، وهنالك ناليل بعض المرضى تخفتي قبل ذلك مبكرًا، في غضون (٤) أسابيع من المُعالجة.

• يُرجى عدم استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا) لِأَكثَر من (١٦) أسبوعٍ من مُعالجة الناليل في كل دورةٍ علاجية.
• وإذا تَكَوَّن لديك مفهومٌ ذهنيٌّ، بأنَّ تأثير ومفعول مَرْهَمِ (أَلَدَارا) قويٌّ جدًّا، أو ضعيفٌ جدًّا، يُرجى اطلاع الطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني بهذا الشأن .

- إذا كُنْتُ قَيدَ المُعالِجَةِ للخللايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية القاعدية (الأساسية):-

- تطبيق خطوات الإرشادات والتعليمات: أيام (الإثنين، الأربعاء والجمعة):-

١) قبل الذهاب إلى السرير: يتم غسل اليدين وموضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء، ثم التجفيف بالكامل.

٢) يتم فتح (عُبُوَّةِ مرهم) جديدة، واستخراج بعض من المرهم على رأس الإصبع.

٣) يتم دهن طبقةٍ رقيقةٍ من المرهم على منطقة الموضع المُصاب، وإضافة (١سم)٠٥، إنش تقريبًا) حول الموضع المُصاب، ثم الفرك برفق على الجلد، حتى يتلاشى المرهم.

٤) وبعد عملية دهن واستعمال المرهم، يتم طرح (عُبُوَّةِ المرهم) المُستعملة جانبًا، ويعقب ذلك غسل اليدين بالمصابون والماء.

٥) يُتَرَكُ المرهم على الموضع المُصاب لمدة (٨ ساعات)، مع عدم رش الماء على الجسم أو الإستحمام أو الإغتسال، خلال هذه المدة.

٦) بعد انقضاء مدة الـ (٨ ساعات) المشار إليها، يتم غسل المرهم في موضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء.

• قم بوضع واستعمال كميةٍ كافيةٍ من مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، لِتَغطِيَةَ منطقة الموضع المُصاب، وإضافة (١سم)٠٥، إنش تقريبًا) حولها يوميًا، على مدار (٥ أيام) مُتتاليةٍ في الأسبوع الواحد، ولفتره (٦ اسابيع) .
أي على سبيل المثال: يتم الدهن والإستعمال من يوم (الإثنين ولغاية يوم الجمعة)، وعدم الإبتعمال يومي: السبت والأحد .

- إذا كُنْتُ قَيدَ المُعالِجَةِ للتقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية :-
-تطبيق خطوات الإرشادات والتعليمات: أيام (الإثنين، الأربعاء والجمعة):-

١) قبل الذهاب إلى السرير: يتم غسل اليدين وموضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء، ثم التجفيف بالكامل.

٢) يتم فتح (عُبُوَّةِ مرهم) جديدة، واستخراج بعض من المرهم على رأس الإصبع.

٣) يتم دهن طبقةٍ رقيقةٍ من المرهم على الموضع المُصاب، ثم الفرك برفق على الجلد، حتى يتلاشى المرهم.

٤) وبعد عملية دهن واستعمال المرهم، يتم طرح (عُبُوَّةِ المرهم) المُستعملة جانبًا، ويعقب ذلك غسل اليدين بالمصابون والماء.

٥) يُتَرَكُ المرهم على الموضع المُصاب لمدة (٨ ساعات)، مع عدم رش الماء على الجسم أو الإستحمام أو الإغتسال، خلال هذه المدة.

٦) بعد انقضاء مدة الـ (٨ ساعات) المشار إليها، يتم غسل المرهم في موضع المُعالجة بالمصابون (غير الحاد) بالماء.

• يتم تطبيق استعمال مَرْهَمِ (أَلَدَارا)، ثلاث مراتٍ اسبوعيًا. فعلى سبيل المثال، يتم دهن المرهم أيَّام (الإثنين، الأربعاء والجمعة) من كل اسبوع .
حتوي كل عُبُوَّةٍ على كميةٍ كافيةٍ من المرهم، تُسَدُّ حاجة مساحة الموضع المُصاب قدرها:(٢٥٠ سم مربع) أي (ما يعادل ٤ إنشات مربعة)، وتتواصل المُعالجة ل لفترة (٤) أسابيع. وبعد إنقضاء (٤) أسابيع من المُعالجة الأولى هذه، سيقوم الطبيب المُعالِجُ بتقييم حالة الجلد. وإذا لم تَبَرَّرَ جميع الأقات، تصبح من الضرورة، إستئناف دورةٍ علاجيةٍ أُخرى جديدةٍ لمدة (٤أسابيع).

-في حالة استِغْمَالِك لكميةٍ من مرهم (أَلَدَارا) أكثر ما ينبغي :-

• يُرجى غسل الكمية الزائدة بالمصابون (غير الحاد) بالماء، وعند اختفاء أي من الآثار السلبية الجانبية على الجلد، يُكَبِّرُكَ إستئناف المُعالجة بعد ذلك.

• وفي حالة ابتلاعك لأيُّ كميةٍ من مَرْهَمِ (أَلَدَارا) يَصَمِّقُ عَرَضِيَّةً طارِئَةً، يُرجى الإلتصال بالطبيب المُعالِج.

-في حالة نسيانك استعمال مرهم أَلَدَارا) :-

• إذا نَسِيتَ أن تَضَع الكمية المقررة من المرهم، ضَعْها فور تَدَكُّرِكَ لها، ثُمَّ استأنفِ بمرنامِجَكِ العلاجي العادي المنتظم. وَيُرجى عَدَمَ استعمال المرهم لِأَكثَر من مرَّةٍ واحدةٍ في اليوم.

• لِتَزيدِ لأي من الإستفسار حول كيفية استعمال هذا المُنتَجِ؛ يُرجى الإلتصال بالطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني .

٤) التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية المُحتمَّلة الحدوث، عند مُعالجة الحالات التالية:-

- لقد تمَّ تصنيف وتبويب التأثيرات الجانبية السلبية المُحتمَّلة الحدوث لهذا الدواء كما يلي :-

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ جدا: (كُتِدُّ على الأُرجح لِأَكثَر من مريض واحد من بين (١٠ مرضى).

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ: (كُتِدُّ على الأُرجح لِأقل من مريض واحد من بين (١٠ مرضى).

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ غير شائعة: (كُتِدُّ على الأُرجح لِأقل من مريض واحد من بين (١٠٠ مرضى).

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ نادرةٌ: (كُتِدُّ على الأُرجح لِأقل من مريض واحد من بين (١٠٠٠ مريض).

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ نادرةٌ جدا: (كُتِدُّ على الأُرجح لِأقل من مريض واحد من بين (١٠,٠٠٠ مريض).

• وكَمَثَلُ جميع الأدوية، فإنَّ مَرْهَمِ (أَلَدارا) قد يَسَبِّبُ تَأَثِّراتٌ جانبيةً، على الرغم من أنَّه لا تظهر على كل مريض يستعمله .

• وَيُرجى الإلتصال بالطبيب المُعالِج أو الصيدلي المعني بأسرر ما يُمكن، حال سَعُورِكَ

والمضايقة والإزعاج أوعدم الرضا والإرتياح أثناء استعمالك لِمْهَمِ (أَلَدَارا) .

• خُدث لبعض المرضى تغييرات في لون جلد منطقة المُعالجة، التي يتم دهنها بهذا المرهم، وبرغم تحسُّن هذه التغييرات بمرور الزمن، إلا أنَّ بعض المرضى تبقى هذه ملامزةً لهم.

• إذا تَأَثَّرَ جلدُك بصفَةٍ سَيئَةٍ عند استعمالك لهذا المرهم: يُرجى التوقف فوراً عن استعماله ، والقيام بِغَسْلِهِ بالمصابون (غير الحاد) بالماء، والإلتصال بالطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني، كما نُوَحِّضُ عند بعض الأفراد إنخفاض عدد كَرَّتاتِ الدم لديهم، جراء استعمال هذا المرهم. وإنَّ إنخفاض عدد كَرَّتَاتِ الدم في هذه الحالة، قد يَجَعَلُكَ عُرضَةً لِلانتهابات وميلاً لِإِزْرِقاقِ وكدماتٍ في الجلد، وقد يَسَبِّبُ إحتساسًا بالإعياء والتعب والإجهاد. لذا، يُرجى عند ملاحظتك لأيٍ من هذه الأعراض المرضية، المبادرة بِالإلتصال فوراً بالطبيب المُعالِج .

• نادرًا ما تمَّ إعلانه رسميًا، عن تأثيراتٍ جانبيةٍ سلبيةٍ خطيرةٍ في الجلد بهذا الشأن. وفي حالة ظُهور أرقامٍ أو بِقعٍ على جلدِكَ، والتي تبدأ كاماكن حمراءً صغيرةً، ثُمَّ تزداد لِتَبْدُو كبقعٍ دائريةٍ صغيرةٍ. ومع احتمالية خُدوث أعراضٍ مثل: الحُكَاكِ والهَرْشِ، الحمى، الإعياء العام، آلام بالمفاصل، صعوبات بالبصر، حُرْقَةً، آلم وحك بالعيون، وتقرحات بالفم. عند ذلك توقِّف عن استعمالك لِمْهَمِ (أَلَدارا)، وقَمِّ فوراً بِالإلتصال بالطبيب المُعالِج .

• نُوحِظُ لدى عِدَّةٍ قليلٍ من المرضى، خُدوث سقوطٍ في شعر منطقة موضع المُعالجة أو حولها.

وبذا، يُرجى عند خُدوث أيَّةِ تَأَثِّراتٍ جانبيةٍ سلبيةٍ خطيرة، أو عند مُلاحظتِكَ لايَّةِ تأثيراتٍ جانبيةٍ سلبيةٍ، لم تَرَ دَكُرها في هذه النشرة الدوائية الطبية العلاجية، بأن تقوم بِالإلتصال بالطبيب المُعالِجُ أو الصيدلي المعني .

- إذا كُنْتُ قَيدَ المُعالِجَةِ لِسالِبِلِ الأعضاء التناسلية :-

- هنالك العديد من التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية المُحتمَّلة الحدوث، الغير مرغوبِ بها، والمُتَوَقَّع حدوثها في جلد منطقة موضع المُعالجة بِمَرْهَمِ (أَلَدارا)، كالآتالي :-

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ جدا: يُصاب بها الجلد، مَحَصَّمَةً الأعراض التالية:- الإحمرار بنسبة (٦١) ٪ من المرضى، تَمَرَّقُ بنسبة (٦٠ ٪ من المرضى) تَقَشُّرًا وانتفاخٍ، قَصَصٌ أسفل الجلد.
• تَقَرُّحاتٍ صغيرةٍ مفتوحةٍ، تُكوِّن القشرة الجلدية التي تتشكَّلُ أثناء الإلتنام، وحَدُثُ أيضًا قَمَعَاتٍ أَسْفَلُ الجلد. كما يَنتاب الرضى أيضاً شَعُورًا بِالْحُكَاكِ والهَرْشِ (٦٢٪ من الرضى)، وشَعُورًا بِالْحرقان بنسبة (٢٦٪ من المرضى)، أو آلمٍ في الأماكن التي دَهِنْتُ مَرْهَمِ (أَلَدارا) بنسبة(٦٨٪ من الرضى).
• إنَّ معظم التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية هذه مُعَدَّةٌ وبسيطةٌ، ويعود الجلد إلى طبيعته خلال اسبوعين، بعد التوقُّف عن المُعالِجَةِ.

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ مثل: الصُّدَاعِ؛ يُصابُ به بَعْضُ المرضى، بنسبة (٤٪ أو أقل) .

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ غير شائعةٍ مثل: أعراض الحُمَّى وشبيه الأنفلونزا، آلام المفاصل والعضلات، هُبوبُ الرحم، آلم عند الجِماعِ بالنساء، صعوبات في الإبتصاب، زيادة إفراز عرق الجسم (التعرق)، الشعور بالمرض، أعراض مرضية بالمرعدة والأمعاء، صوت طنين بالأذنين، تَوَرُّدُ وإحمرار الوجه، الشعور بالتعب والوخة، الصداع النصفي، الشعور بِوَجْخِ كالدبابيس وكالآلِر، الأرق وقلة النوم، الإكتئاب، فقدان الشهية، انتفاخ العُدْدُ، والتهابات بكتيرية وفيروسية وفطرية مثل: (تَقَرُّحاتُ نزلات البرد)، التهاب المهبل والحمى القلاعية، الشُّعَالُ والرَّكَامِ واحتقان الحلق.

• حدوث آثار جانبيةٍ نادرةٌ جدًّا: حدوث آثار جانبيةٍ وآلم شديدة. آلم بجلد فتحة المهبل، ونادرًا جدًّا ما تُسَكَّلُ صعوبات لبعض النساء عند خروج البول.
• يُرجى في حالة خُدوث أي من التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية والمضاعفات أعلاه، الإلتصال فوراً مع ذوي الإحتصاص وطلب المشورة والمُساعدَةَ الطبيَّةِ .

- إذا كُنْتُ قَيدَ المُعالِجَةِ للخللايا العُدْثِيَّةِ الورمية والسرطانية القاعدية (الأساسية):-

• هنالك العديد من التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية المُحتمَّلة الحدوث، الغير مرغوبِ بها، والمُتَوَقَّع حدوثها في جلد منطقة موضع المُعالجة بِمَرْهَمِ (أَلَدارا).
• إنَّ التَأَثِّراتُ الموضعية للجلد، هي إشارَةٌ على أنَّ هذا الدواء يعمل وَيُفيد بصورةٍ مناسبةٍ، كما هو مطلوب. والتَأَثِّراتُ هي :-

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ جدا مثل: إصابة الجلد موضع المُعالجة بالحك والهَرْشِ البسيط.
• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ مثل: الشعور بالوخز كالدابيس وكالآلِر، تُكوِّن أماكن صغيرة مُنتخفة في الجلد، مع آلم وحرقان وتُهَيُّج، ونزيف وإحمرار وطفح جلدي. وإذا أصبحت التَأَثِّراتُ مُزعِجَةً أثناء فترة المُعالجة. ففي هذه الحالة يتوجب الإلتصال مع الطبيب المُعالِجِ، والذي بدوره قد يوصي بالتوقف عن المُداواة والإبتصاب لِمْهَمِ (أَلَدارا) لبضعة أيامٍ، أي: (فترة راحٍ قصيرةٍ عن العلاج). وإذا كانت هنالك حالة صديد، أو على وشك حدوث التهاب، يتوجب عند ذلك مناقشة الأمر مع الطبيب المُعالِجِ. وفيما عدا ما ذُكِرَ أعلاه من تَأَثِّراتٍ، فإنَّ التَأَثِّراتُ الشائِعَةَ تتصقن: انتفاخ العُدْدُ وآلم الظَّهْرِ.

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ غير شائعةٍ حيث: يُصاب بَعْضُ المرضى بِتَغْيِيراتٍ صحيةٍ في موضع المُعالجة ، مثل: (حَرَّاج صديدي، التهاب، انتفاخ، ظهور نُجُورٍ جَرَبٍ، تَحَلُّلُ في الجلد، بثورَتَمُرَّجِجِيَّةٌ، التهاب الجلد)، أو التَهَيُّجُ المرط، والشعور بالمرض، وجفاف الفم، وأعراض ما يُشبهه الأنفلونزا والشعور بالتعب والإعياء.

- إذا كُنْتُ قَيدَ المُعالِجَةِ للتقرنات الجلدية الموضعية الحرشفية الورمية :-

• هنالك العديد من التَأَثِّراتُ الجانبية السلبية المُحتمَّلة الحدوث، الغير مرغوبِ بها، والمُتَوَقَّع حدوثها في جلد منطقة موضع المُعالجة بِمَرْهَمِ (أَلَدارا).
• إنَّ التَأَثِّراتُ الموضعية للجلد، هي إشارَةٌ على أنَّ هذا الدواء يعمل وَيُفيد بصورةٍ مناسبةٍ، كما هو مطلوب. والتَأَثِّراتُ هي :-

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ جدا مثل: إصابة الجلد موضع المُعالجة بالحك والهَرْشِ البسيط.
• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ شائعةٌ تتضمن: الألم، الحرقان، التهيُّج أو الإحمرار. وإذا أصبحت التَأَثِّراتُ

مُزعِجَةً أثناء فترة المُعالجة. ففي هذه الحالة يتوجب الإلتصال مع الطبيب المُعالِجِ، والذي بدوره قد يوصي بالتوقُّف عن المُداواة والإبتصاب لِمْهَمِ (أَلَدارا) لبضعة أيامٍ، أي: (فترة راحٍ قصيرةٍ عن العلاج). وإذا كانت هنالك حالة صديد، أو على وشك حدوث حالة التهاب، يتوجب عند ذلك مناقشة الأمر مع الطبيب المُعالِجِ. وفيما عدا ما ذُكِرَ أعلاه من تَأَثِّراتٍ، فإنَّ التَأَثِّراتُ الشائِعَةَ تتصقن: الصداع، فقدان شهية الأكل، الغثيان ودُوار البحر، آلام بالعضلات والمفاصل والشعور بالتعب والإعياء .

• تَأَثِّراتٌ جانبيةٌ غير شائعةٍ مثل: يُصاب بَعْضُ المرضى بِتَغْيِيراتٍ صحيةٍ في موضع المُعالجة، مثل: (النزف، التهاب، حُرَّاج صديدي، حسّاسيةٌ، انتفاخ، تُكوِّن أماكن صغيرة مُنتخفة في الجلد، الشعور بالوخز كالدابيس وكالآلِر، ظهور نُجُورٍ جَرَبٍ وندبات وتقرحات، وشعور