Gentacin® 0.3%

Gentamicin Sulfate

intment

Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine, even if this is a repeat prescription.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
 If you have any further questions, ask your doctor.
- or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

- What Gentacin is and what it is used for
- 2. Before you take Gentacin
- 3. How to use Gentacin
- 4. Possible side effects
- 5. How to store Gentacin
- Further information
 To report any side effects
- What Gentacin is and what it is used for

Gentacin eye cintment is an ophthalmic antibiotic. It works by slowing the growth of, or killing, sensitive bacteria. It is used for treating surface eye infections caused by certain bacteria. It may also be used for other conditions as determined by your doctor.

2. Before you take Gentacin

Do not use Gentacin eye ointment if:

 you are allergic to any ingredient in Gentacin eye ointment

Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.

Tell your health care provider if you have any

medical conditions, especially if any of the following apply to you:

- if you are pregnant, planning to become pregnant, or are breast-feeding
- if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement
- if you have allergies to medicines, foods, or other substances

other substances Take special care:

- Prolonged use of topical antibiotics may give rise to overgrowth of non-susceptible organisms including fungl. Bacterial resistance to Gentacin may also develop. If purulent discharge, inflammation or pain becomes aggravated, the patient should discontinue use of the medication and consult a physician.
- If irritation or hypersensitivity to any component of the drug develops, the patient should discontinue use of this preparation, and appropriate therapy should be instituted.
- Ophthalmic ointments may retard corneal healing.
- Do not use Gentacin ointment for future eye problems without checking with your doctor.
- Be sure to use Gentacin ointment for the full course of treatment. If you do not, the medicine may not clear up your infection completely. The

may not clear up your infection completely. The bacteria could also become less sensitive to this or other medicines. This could make the infection harder to treat in the future.

Pregnancy and breast-feeding

If you become pregnant, contact your doctor. You will need to discuss the benefits and risks of using Gentacin ointment while you are pregnant. If you are or will be breast-feeding while you use Gentacin ointment, check with your doctor. Discuss any possible risks to your baby.

Driving and using machines

Gentacin ointment may cause blurred vision. Use Gentacin ointment with caution. Do not drive, use machineries or other possibly unsafe tasks until your vision is clear.

Using other medicines

Using other medicines

Some MEDICINES MAY INTERACT with Gentacin.

Because little, if any, of Gentacin is absorbed into
the blood, the risk of it interacting with another

medicine is low.

Ask your health care provider if Gentacin may interact with other medicines that you take. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine.

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

If you are using more than one type of eye medicine, the medicines must be used at least 5 minutes apart. Eye ointments should be used last.

3. How to use Gentacin

Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part that you do not understand. Use Gentacin eye ointment exactly as directed. Do not use more or less of it or use it more often than prescribed by your doctor

prescribed by your doctor Apply a sufficient amount of Gentacin eye ointment 2 - 3 times a day. Reduce the number of daily application when favorable response occurs, and eventually discontinue therapy as cure is

- To apply the eye ointment, follow these steps:
- Wash your hands thoroughly with soap and water.
- Use a mirror or have someone else apply the ointment.
- Avoid touching the tip of the tube against your eye or anything else. The ointment must be kept clean.
- 4. Tilt your head forward slightly.
- Holding the tube between your thumb and index finger, place the tube as near as possible to your eyelid without touching it.
- Brace the remaining fingers of that hand against your cheek or nose.
- With the index finger of your other hand, pull the lower lid of your eye down to form a pocket.
- Place a small amount of ointment into the pocket made by the lower lid and the eye. A 1/2-inch (1.25-centimeter) strip of ointment usually is enough unless otherwise directed by your doctor.
- Gently close your eyes and keep them closed for 1 to 2 minutes to allow the medication to be absorbed.
- 10. Replace and tighten the cap right away.
- Wipe off any excess ointment from your eyelids and lashes with a clean tissue. Wash your hands again.

If you use more Gentacin than you should: in adults an overdose due to the use of the eye ointment is unlikely, however, if you use too many amount or if the ointment is accidentally swallowed, you should contact your doctor.

If you forget to use Gentacin Apply the cintment as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, do not double your dose and carry on with the normal scheduled dose. If you have any further question on the use of this

fryou have any further question on the use of this product, ask your doctor, Healthcare provider or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines Gentacin can cause side Like all medicines Gentacin can cause side effects although not everybody gets them.

Bacterial and fungal corneal ulcers have developed during treatment with Gentacin eye ointment

The most frequently reported adverse reactions are ocular burning and irritation upon drug instillation.

non-specific conjunctivitis, conjunctival epithelial defects and conjunctival hyperemia.

Other adverse reactions which have occurred

rarely are allergic reactions, thrombocytopenic purpura and hallucinations
If irritation or sensitivity occurs, tell your doctor at

once. The treatment should be stopped.
If any other side effect gets serious or if you notice
any side effect not listed in this leaflet, please tell
your doctor or pharmacist

5. How to store Gentacin?

- Keep out of the reach and sight of children.
 - Store below 30°C.
- Do not refrigerate or freeze.Keep the tube tightly closed.

- Do not use the ointment after the expiry date (marked 'Exp') on the tube and the carton.
- The expiry date refers to the last day of that
- month.

 Stop using the container one month after
- Stop using the container one month after first opening, to prevent infections.
- Medicines should not be disposed of via waste water or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.
- Do not pass this medicine on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours

6. Further information What Gentacin contains

Active ingredient is Gentamicin Sulphate each gm contains Gentamicin Sulphate (BP) equivalent to 3 mg of Gentamicin.

Other ingredients are: Liquid Anhydrous Lanoline, Liquid paraffin, Nipasept, Water for injection, White soft Paraffin.

Presentation:

Cream coloured homogenous ointment.
5 gm Aluminium tube with plastic screw cap

Marketing Authorisation Holder and

Medical and Cosmetic Products Company Ltd. (Riyadh Pharma) P.O.Box 442, Riyadh 11411 Fax: +966 11 265 0505 Email:

contact@rivadhpharma.com
For any information about
this medicinal product,
please contact the local
representative of marketing
authorisation holder:
Saudi Arabia

Marketing department

Tel: +966 11 265 0111

Email: marketing@riyadhpharma.com

This leaflet was revised in (04/2018), version no. (004)

7. To report any side effects

Kingdom of Saudi Arabia

-National Pharmacovigilance and Drug Safety Center (NPC)

• Fax:+966-11-205-7662

 To call the executive management of the vigilance & crisis management,
 Tel.: +966-11-2038222

ext.: 2353 - 2356 - 2317 - 2354 - 2334 - 2340

- Toll-free: 8002490000
- E-mail: npc.drug@sfda.gov.sa
- Website: www.sfda.gov.sa/npc

This is a medicament

- A medicament is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicaments out of the reach of children

Council of Arab Health Ministers Union of Arab Pharmacists



Manufactured by RIYADH PHARMA Medical and Cosmetic Products Co. Ltd. Riyadh, Saudi Arabia

> GENTACIN® is a trademark ITEM CODE: PIL0555

مرهم للعين - ٥ جم

منتاسين® ۳۰,۰% جنتامايسين سلفات

قم بقراءة هذة التشرة جيداً قبل إستعمال أو تتاول هذا

.مرهم

 احتفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً. في حال كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر قم

لي منارة الطبيب أو الصيدلي. إن هذا الدواء قد تم صرفة خصيصا لك بناءاً على وصفة طبية، ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإنَّ كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وان عانيت منها.

قم بالإتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الاصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تحتوي هذه التشرة على:

مأهو جنتاسين وما هي دواعي استعماله ما يجب أن تعرفه قبل القيام بتناول جنتامين

طريقة استخدام جنتاسين

الأعراض الجانبية المحتملة ظروف تخزين جنتاسين

معلومات إضافية للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

. ماهو جنتاسين وما هي دواعي استعماله

مرهم العين جنتاسين هو مضاد حيوي موضعي للعين. وهو يعمل عن طريق إبطاء نمو، أو قتل البكتيريا الحساسة. فهو يستخدم لعلاج التهابات العين السطحية التي تسببها بكتيريا معينة. ويمكن أيضا أن تستخدم لعلاج أمراض أخرى على النحو الذي يحدده الطبيب.

ما يجب أن تعرقه قبل القيام بتناول جنتاسين

لا تستخدم مرهم العين جنتاسين إذا: • لديك حساسية من أي عنصر في مرهم العين جنتاسين اتصل بطبيبك أو مقدم الخدمات الصحية على الفور إذا كان أي من هذه تنطبق عليك.

أخبر مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي ظروف صُحيَّة، لا مبيما إذا كان أي من الحالات التاليُّة

إذا كنتى حاملا، أو تخطيطين لتصبحي حاملا، أو

تقومين بالرضاعة الطبيعية إذا كنت تستخدم اي دواء بوصفة طبية او بدون وصفة

طبية، اومستحضرات عشبية، او المكملات الغذائية إذا كان لديك حساسية من ادوية أو اغذية، أو مواد أخرى

• الاستخدام افترات طويلة من المضادات الحيوية

الموضعية قد يؤدي إلى فرط نمو الكائنات الحية غَيْر الحساسة بما في ذلك الفطريات المقارمة البكتيرية للجنتامايمين قد تتطور أيضا إذا حدث تقاقم للافرازات القيحية، الالتهاب أو الألم ، ينبغي على المريض التوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطيب.

 إذا حدث تهيج أو فرط الحساسية لأي من مكونات هذا الدواء ، ينبغي على المريض التوقفُ عن استخدام هذا المستحضر، ويجب وضع العلاج المناسب.

· مراهم العيون قد تؤخر التنام القرنية.

• لا تستخدم مرهم العين جنتاسين لمشاكل العين المستقبلية دون التحقق مع طبيبك.

تأكد من استخدام مرهم جنتاسين لدورة كاملة من العلاج. إذا لم تقم بذلك، الدواء قد لا يقضى على العدوى الخاصة بك تمامًا. يمكن أن تصبح البكتيريا أيضا أقل حساسية لهذا المستحضر أو الأدوية الأخرى. هذا يمكن

أن يجعل العلاج أكثر صعوبة في المستقبل.

الحمل والرضاعة الطبيعية إذا أصبحتي حاملاء الصلي بطبيبك. ستحتاجين لمناقشة فوائد ومخاطر استخدام مرهم جنتاسين أثناء الحمل. إذا كنتي أو ستقومين بالرضاعة الطبيعية أثناء استخدام مرهم جنتاسين، تحققي مع طبيبك. لمناقشة أي مخاطر محتملة لطفاك

القيادة واستخدام الآلات

قد يسبب مرهم جنتاسين عدم وضوح الروية. استخدم مرهم جنتاسين بحذر. لا تقم بالقيادة او استخدام الآلات او تقوم بمهام غير آمنة حتى تصبح رويتك واضحة. استخدام الادوية الاخرى:

اسال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان جنتاسين قد يتفاعل مع الادوية الاخرى التي تتناولها. تحقق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبلُ أن تبدأ، أو تتوقف، أو

تغير مقدار الجرعة لأي دواء. أُخَبِرُ طبيبِكُ أَو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول

عليها دون وصفة طبية. إذا كُنتُ تَستَّخدم أكثرُ من نوع من ادوية العين، يجب أن يكون بين الأدوية على الأقل ٥ دقائق. مراهم العين يجب

استخدامها في النهاية.

٣. طريقة استخدام جنتاسين

اتبع التعليمات على الوصفة بعناية، اطلب من طبيبك أو الصيدلي تفسير أي جزء لا تفهمه. استخدم جنتاسين مرهم العين بالصّبط حسب التوجيهات. لا تستخدم اكثر أو أقل من ذلك أو تستخدمه لمرات اكثر من وصفه من

م. ضع كمية كافية من جنتاسين مرهم العين ٢-٣ مرات في اليوم. قم بتقليل عدد الاستخدام اليومي عند حدوث استجابة مواتية، وفي النهاية توقف عن العلاج عند تحقّق الشفاء.

لاستخدام مرهم العين، اتبع الخطوات التالية:

١. اغمل يديك جيدا بالماء والصابون. استخدام مرآة أو اذا كان لديك شخص آخر يضع لك

تجنب لمس طرف الأنبوب على عينيك أو أي شيء

آخر. يجب أن يبقى المرهم نظيف. أدر رأسك إلى الأمام قليلا.

امسك الأنبوب بين الإبهام والسبابة، وضع الأنبوب أقرب ما يمكن للجفن دون لممه. ثبت الأصابع المتبقية من تلك اليد على الخد أو الأنف.

بالسبابة من يدك الأخرى، اسحب الغطاء السفلي من عينك إلى أمنال لتشكيل جيب.

ضع كمية صغيرة من مرهم في الجيب التي أدليت بها الجفن المنظى والعين. ٢/١ - بوصة (١,٢٥ سنتيمتر) شريط من المرهم عادة يكفي ما لم يكن موجها خُلافٌ نلك من قبل الطبيب.

٩. أغلق عينيك بلطف واحتفظ بها مغلقة لـ ١ إلى ٢ دقيقة للمماح بامتصاص الدواء.

اعد وأحكم الغطاء على الفور.

امسح أي مرهم زائد من الجفون والرموش بمنديل نظيف. أغسل يديك مرة اخرى. إذا وضعت جنتاسين أكثر من اللازم يجب عليك: في ألبالغين من غير المحتمل استخدام جرعة زائدة من مرهم

العين ، ومع ذلك، إذا كنت وضعت الكثير من المرهم أو إذا أبتلعت المرهم عن طريق الخطأ، يجب عليك الاتصال

أِذَا تَسْبِيتُ أَنْ تَسْتَخْدَم جَنْتَاسِينَ ضَعَ المرهم حالما تَتَذَكَّر. ومع ذلك، إذا كان الوقت تقريبا قد حان لاستخدام الجرعة القادمة، لا تضاعف الجرعة واستمر في الجرعة المقررة aul-1

اذا كان لديك أي اسئلة عن استخدام هذا الدواء ،اسال طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية جنتاسين يمكن أن يتسبب في آثار جانبية على الرغم من أن ليم الجميع يحدث لهم. تقرحات القرنية البكتيرية والفطرية تظهر خلال فترة

العلاج بمرهم جنتاسين للعين. التفاعلات الجانبية الأكثر شيوعًا هي حرقة العين وتهيجها عند وضع المرهم ، التهاب الملتحمة غير المحدد ، العيوب

الظهارية للملتحمة واحتقان الملتحمة.

الأعراض الجانبية الأخرى التي حدثت في حالات نادرة هي الحساسية ، فرفرية نقص الصفيحات والهلوسة. في حالة حدوث تهيج أو حساسية، لخبر طبيبك فورا. يجب

أنَّ توقف العلاج. إذا اصبح اي اثر جانبي آخر خطيرا او إذا لاحظت اي أثار جانبية عير المذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي

ه . ظروف تخزین جنتاسین بحفظ بعيدا عن متناول وإيصار الأطفال.

- يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة منوية.
- لا يوضع بالثلاجة أو يجمد.
 حافظ على الانبوب مغلقة بإحكام.
- لا تستخدم المرهم بعد تاريخ أنتهاء (المدون) على

بعض الأدوية قد تتفاعل مع جنتاسين، إن وجدت. لأن القليل من جَنْتَاسين يتم امتصاصه في الدم، وخطورة ذلك النّفاعل مع دواء آخر منخفضة.

الانبوب والكرتون. تاريخ الانتهاء يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر توقف عن استخدام العبوة بعد شهر واحد من أول فتح

لها ، لمنع العدوي. لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسال الصيدلي عن كيفية

التخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة. سُوف تساعد هذه التدابير لحماية البيئة. • لا تمرر هَذَا الدواء إلى الآخرين. قد يضرهم، حتى لو اعراضهم هي ذاتها التي كانت لديك.

٢. معلومات إضافية على ماذا يحتوي جنتاسين

المادة الفعالة هي جنتامايمين سلفات، كل جرام يحتوي على جنتامايمين سلفات (دستور الأدوية البريطاني) ما

يعادل ٣ ملجم من جنتامايسين. المكونات الأخرى هي: لانولين انهيدروس السائل ، البار أفين السائل، نيباسبت، مياه للحقن، البار أفين الأبيض

الشكلُّ الصيدلاني:

مر هم للعين متجانس بلون كريمي انبوب من الالومنيوم يحتوي على ٥ جم وغطاء دائري .

اسم وعنوان مالك رخصة النسويق والمصنع شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة (الرياض فارما)

ص.ب. ٤٤٢ الرياض ١١٤١١ فاكس: ٥٠٥،٥١٠ ١٢٦٥ + ٩٦٦١١٢٦٥ + البريد الإلكتروني:

contact@rivadhpharma.com لأية معلومات عن هذا المنتج الطبي، يرجى الاتصال

على صاحب الترخيص والتسويق: المملكة العربية السعودية

قسم التمويق الرياض

تلفون: ۲۱۱۱،۱۱۱،۱۲۲۰+ البريد الإلكتروني:

marketing@rivadhpharma.com

تمت مراجعة هذه التشرة بتاريخ (٢٠١٨/٠٤) رقم التسخة

٧. للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

- · المملكة العربية السعودية - المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية:
- فاكس: ٢٦٢٧-٥٠٧-١١-٢٠٩+
- للإتصال بالإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات، ماتف· ۲۲۲۸۳۰۲-۱۱-۲۲۴+ (تحويلة: ٢٣٥٢ - ٢٣٥١ - ٢٣١٧ - ٢٥٥٤ - ٢٣٣٤
 - (YTE . -• الهاتف المجانى: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠
- البريد الالكتروني:
- npc.drug@sfda.gov.sa الموقع الالكتروني:

www.sfda.gov.sa/npc

ان هـ ذا الـ دواء

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً

للتعليمات يعرضك للخطر. · اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص

عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك. · فالطبيب والصيدلاني هما الذبيران بالدواء وبنفعه

لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

• لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متتاول أيدى الأطفال مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

البر بياضي

إنتاج الرياض فارما شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة الرياض - المملكة العربية السعودية

جنتاسين علامة تجارية