

دليل المرضى ومقدمي الرعاية:

ما تحتاج إلى معرفته حول دواء ليبونكس وخطر ندرة المحببات

ما هو دواء ليبونكس لماذا يُوصف؟

ليبونكس دواء يصرف بوصفة طبية لعلاج المرضى المصابين بالفصام الذين لم يستجيبوا للأدوية الأخرى. ليبونكس قد يقلل أيضاً من خطر السلوك الانتحاري. يستخدم ليبونكس لعلاج مرضى الفصام المقاوم ومرضى الفصام الذين لديهم تفاعلات جانبية عصبية شديدة غير قابلة للعلاج من أدوية مضادات الذهان الأخرى بما في ذلك مضادات الذهان الغير تقليدية.

مقاومة العلاج تُعرف بانعدام التحسن السريري المرضي بالرغم من استخدام جرعات كافية من دواعين مختلفين على الأقل من أدوية مضادات الذهان بما في ذلك مضادات الذهان الغير تقليدية ويجب أن تُوصف هذه الأدوية لفترة كافية.

ليبونكس يُوصف في الأضطرابات النفسية التي تحدث أثناء مرض باركنسون في حالة فشل العلاج النموذجي.

ما هي المعلومات التي يجب معرفتها عن أكثر الأعراض الجانبية الخطيرة عند استخدام دواء ليبونكس؟

ليبونكس يمكن أن يسبب ندرة المحببات. ندرة المحببات هو اضطراب في الدم يحدث لنوع معين من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا المتعادلة عندما لا يتم تصنيعها أو تصنع بكمية لا يكفي. وهذا يُصعب على جسمك محاربة العدو.

قبل أن تتمكن من بدء ليبونكس أيضاً وخلال فترة العلاج، يجب عليك أن تقوم بعمل اختبارات الدم بصفة دورية لقياس عدد الخلايا المتعادلة في دمك. هذا الاختبار يسمى العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC). إذا قل عدد الخلايا المتعادلة (ANC) بصورة منخفضة جداً فإنه قد تضطر إلى التوقف عن تناول دواء ليبونكس. سوف يقرر طبيبك إذا أو متى يمكن بدء ليبونكس بأمان مرة أخرى. هذا ليس الأثر الجانبي الخطير الوحيد لدواء ليبونكس. أخبر طبيبك المعالج عن الآثار الجانبية الخطيرة الأخرى في حالة حدوثها.

ما هي أعراض نقص المحببات؟

قد لا يحدث لديك أية أعراض على الإطلاق. قياس عدد الخلايا المتعادلة في دمك هو الطريقة الوحيدة للتتأكد من وجود ندرة المحببات. وقياس عدد الخلايا المتعادلة يساعد طبيبك على معرفة ما إذا كنت أكثر احتمالاً للإصابة بالعدوى.

⚠️ إذا حدث لديك أي من هذه الأعراض التالية، تحدث إلى طبيبك على الفور

- العدوى، بما في ذلك الجلد، الحنجرة، المسالك البولية، المهبل، الالتهاب الرئوي، أو أي عدوى أخرى
- حمى أو رعشة
- فروح أو تقرحات داخل الفم، اللثة، أو على الجلد
- الجروح التي تستغرق وقتاً طويلاً للشفاء
- الشعور بأن لديك أعراض الإنفلونزا
- ألم أو حرقان أثناء التبول
- الإفرازات المهبلية الغير عادية أو الحكة
- الألم في البطن
- القروح أو الألم في أو حول منطقة المستقيم الخاص بك
- الشعور بضعف شديد أو تعب

ما الذي يمكن القيام به للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بندرة المحببات؟

يمكنك القيام بثلاثة أشياء هامة:

- ١- قم بفحص دمك حسب تعليمات الطبيب
- ٢- أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها (دواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية) وإذا كنت تبدا دواء جديداً
- ٣- أخبر طبيبك فوراً إذا كان لديك حمى أو شعور بالمرض

ما هي اختبارات الدم المطلوبة لعلاج ليبونكس؟

- سيطلب منك طبيبك إتمام فحوصات الدم الخاصة بك
- ستحتاج إلى الحصول على فحوصات دمك في المواعيد التالية أو حسب توجيهات الطبيب الخاص بك:
 - فحوصات الدم أسبوعياً لمدة ٦ أشهر من بداية استخدام ليبونكس
 - كل أسبوعين لمدة ٦ أشهر إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) في المعدل القياسي
 - كل ٤ أسابيع بعد أول سنة إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) في المعدل القياسي

أحصل على
اختبار الدم
الخاص بك

- إذا كان العدد الكلي للخلايا المتعادلة (ANC) الخاصة بك منخفض جداً، سيعين طبيبك جدولة اختبارات الدم بشكل أكثر تكراراً.

مراقبة النتائج

- **تذكر:** يجب عليك إتمام اختبارات الدم المطلوبة حتى تستطيع الحصول على دواء ليبونكس من الصيدلية. يرجى الرجوع إلى منشورات معلومات المرضى للحصول على معلومات إضافية.

لا اختبارات دم

لا دواء

- يمكنك الإبلاغ عن أي مشكلة أو الأعراض الجانبية من خلال:
شركة نوفارتيس
تلفون: ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠
فاكس: ٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧
الإلكترونى البريد: adverse.events@novartis.com

الهيئة العامة للغذاء والدواء المركز الوطنى للتيقظ الدوائى

الرقم المجانى: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠
الفاكس: ٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الإيميل: npc.drug@sfda.gov.sa
او عن طريق الانترنت: <https://ade.sfda.gov.sa>