

Patient Alert Card

إليكويس®
(أبيكسابان)



احمل هذه البطاقة معك
في جميع الأوقات

اعرض هذه البطاقة على الصيدلي وطبيب الأسنان وأي من متخصصي الرعاية الصحية الآخرين الذين يقدمون لك العلاج.

معلومات للمرضى

• تناول إليكويس® بانتظام حسب تعليمات الطبيب المعالج.
إذا فاتتك إحدى الجرعات، فتناولها بمجرد تذكرها ومن ثم واصل اتباع جدول جرعاتك المعتاد.

• لا تتوقف عن تناول إليكويس® دون التحدث مع طبيبك، نظرًا لأنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو غيرها من المضاعفات. (انظر النشرة الداخلية المرفقة)

• يساعد إليكويس® على تخفيف كثافة دمك. إلا أن هذا قد يزيد من خطر التعرض للنزيف. (انظر النشرة الداخلية المرفقة)

• علامات وأعراض النزيف تتضمن كدمات أو النزيف تحت الجلد أو براز أسود اللون أو وجود دم في البول أو نزيف الأنف أو الدوار أو التعب أو الشحوب أو الضعف أو الصداع الشديد المفاجئ أو خروج دم مع السعال أو خروج دم مع القيء.

• إذا لم يتوقف النزيف من تلقاء نفسه، فعليك طلب الرعاية الطبية فوراً.

• إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية، فأخبر طبيبك بأنك تتناول إليكويس®

"لمزيد من المعلومات إسأل الطبيب أو الصيدلي"

"المعلومات الواردة في هذه المادة هي لأغراض تثقيفية وتعليمية فقط، ولا غنى عن النصيحة التي يقدمها الطبيب أو أي مختص مؤهل للرعاية الصحية"

أنا أخضع لعلاج مضاد للتجلط باستخدام إيكويس® (أبيكسابان) لمنع تكوّن الجلطات الدموية

يطلب من المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية الإبلاغ عن أي تفاعلات ضارة مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني.

معلومات لمتخصصي الرعاية الصحية:

• إيكويس® (أبيكسابان) هو مضاد للتجلط يتم تناوله عن طريق الفم ويعمل عن طريق تثبيط انتقائي مباشر للعامل العاشر النشط.

• قد يزيد إيكويس® من خطر الإصابة بنزيف. في حالة حدوث نزيف شديد، ينبغي إيقاف إيكويس® (أبيكسابان) على الفور.

• لا يتطلب العلاج باستخدام إيكويس® مراقبة روتينية للتعرض.

قد تكون مقايضة الكمية المعاييرة لمضاد العامل العاشر النشط مفيدة في حالات استثنائية، على سبيل المثال، الجرعة الزائدة والجراحة الطارئة

لا يوصى باختبارات التجلط بزمن البروثرومبين (PT) ونسبة تجلط الدم (INR) وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) - انظر ملخص خصائص المنتج

يرجى إكمال هذا القسم أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

الاسم: _____

تاريخ الميلاد: _____

داعي الاستخدام: _____

الجرعة: _____
مجسم مرتين يوميًا

اسم الطبيب: _____

هاتف الطبيب: _____

Patient Alert Card

Eliquis[®]

(apixaban)

Carry this card with
you at all time



Show this card to your pharmacist, dentist and
any other healthcare professionals that treat you.

Information for PATIENTS

- Take Eliquis[®] regularly as instructed by your treating physician. If you miss a dose, take it as soon as you remember and continue to follow your dosing schedule.
- Do not stop taking Eliquis[®] without talking to your doctor, as you are at risk of suffering from a stroke or other complications. (refer to the insert leaflet)
- Eliquis[®] helps to thin your blood. However, this may increase your risk of bleeding. (refer to the insert leaflet)
- Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding under the skin, black or tar stools, blood in urine, nose-bleed, dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe headache, coughing up blood or vomiting blood.
- If the bleeding does not stop on its own, **immediately seek medical attention.**
- If you need surgery, inform your doctor that you are taking Eliquis[®].

"For more information ask the doctor or pharmacist"

"The information provided on this material is for general informational and educational purposes only, and is not meant to be a substitution for advice provided by your doctor or other qualified healthcare professional"

This risk minimization activity is approved by the SFDA

ELIQUIS[®] (Apixaban) Patient Alert Card Version 2.0 May 2019

I am under anticoagulation treatment with Eliquis® (apixaban) to prevent blood clots

Patients and Health Care Professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system.

Information for HEALTHCARE PROFESSIONALS

- Eliquis® (apixaban) is an oral anticoagulant acting by direct selective inhibition of factor Xa.
- Eliquis® may increase the risk of bleeding. In case of major bleeding events, it should be stopped immediately.
- Treatment with Eliquis® does not require routine monitoring of exposure. A calibrated quantitative anti-Factor Xa assay may be useful in exceptional situations, e.g., overdose and emergency surgery (prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT) clotting tests are not recommended) - see SmPC

Please complete this section or ask your doctor to do it

Name: _____

Birth Date: _____

Indication: _____

Dose: _____ mg twice daily

Doctor's Name: _____

Doctor's telephone: _____

For extra copies, please contact Pfizer Saudi Limited at +966 12 2293500

ELIQUIS® (Apixaban) Patient Alert Card Version 2.0 May 2019



PP-ELI-SAU-0077