

بطاقة المريض

دليل الاستخدام الآمن لمستحضر جارديانس (ايمباجليفلوزن)

احتفظ بهذه البطاقة معك في كل الأوقات



Boehringer
Ingelheim

بويمرينغر إنجيلهيم
ص. ب ٦٨٤٢٣
الرياض ١١٥٢٧- المملكة العربية السعودية

Jardiance®
(empagliflozin)



إجعل جارديانس جزءاً من حياتك اليومية

حبة واحدة يومياً



تناوله في أي وقت خلال اليوم



مع الطعام أو بدون طعام



تأكد من تناول جارديانس كل يوم حتى وإن كنت تشعر بأنك في حالة جيدة. هذا ضروري، لأن تخطي الجرعات قد يسبب زيادة مستوى السكر في دمك مرة أخرى.

إذا نسيت جرعة خذها بمجرد أن تتذكرها، وإن مر يوم كامل بدون جرعة لا تتناول قرصين بل واصل فقط بجرعتك العادية، ولا تتناول أبدا قرصين في ٢٤ ساعة.




حاول تناول جارديانس في نفس الوقت كل يوم مثلاً، مع الإفطار أو بعد غسل أسنانك حيث يمكن أن يساعدك ذلك على أن يكون جارديانس جزءاً من حياتك اليومية بشكل سريع.

اتبع تعليمات طبيبك عند تناول جارديانس

- جارديانس علاج يؤخذ بالفم لداء السكري من النوع الثاني.
- لم يُعتمد استخدام جارديانس للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.
- لم يُعتمد استخدام جارديانس للأشخاص المصابين بالحمّاض الكيتوني السكري (زيادة الكيتونات في الدم أو البول).
- قد يسبب جارديانس آثار جانبية منها:
الحمّاض الكيتوني وهي حالة نادرة و لكنها خطيرة و قد تهدد الحياة نتيجة النقص الحاد في الإنسولين مما ينتج عنه زيادة الكيتونات في الدم أو البول (كيتونات في دمك أو بولك).
- يُستخدم جارديانس لعلاج داء السكري من النوع ٢ في المرضى البالغين (عمر ١٨ عام وما فوق).
- يستخدم جارديانس في حال عدم انتظام السكر لديك بالرغم من الإلتزام بالحمية الغذائية و التمارين الرياضية مع أدوية السكر الأخرى.

الآثار الجانبية المحتملة لجاردنياس



شأنه شأن جميع الأدوية الأخرى، فإن المرضى الذين يستعملون جاردنياس قد يتعرضون لحدوث آثار جانبية، غير أنها لا تحدث لجميع الأشخاص. اتبع بحرص نصيحة طبيبك إذا لاحظت أي آثار جانبية.

يحدث الحُمّاض الكيتوني في الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع ١ أو ٢ ولكنه أقل حدوثاً لدى المصابين بالنوع ٢. قد يحتاج إلى العلاج في المستشفى، كما يمكن أن يحدث حتى وإن لم يكن جلوكوز الدم مرتفعاً جداً.

أعراض الحُمَاض الكيتوني

- فقدان الشهية أو ألم في منطقة المعدة (البطن) وتقيؤ (تقيؤ لأكثر من ساعتين)
- إذا كانت رائحة نفسك تشبه رائحة الفواكه (أسيتون).
- التعب أو الارتباك أو تشويش الذهن.
- العطش أو شدة جفاف الفم والجلد.
- الشعور بالعطش وكثرة التبول.
- سرعة وعمق التنفس.



في حال تعرضك للأعراض السابقة اتصل بطبيبك فوراً أو اذهب إلى قسم الطوارئ

الأسئلة والأجوبة الشائعة عن جارديانس

س. كيف يخفض جارديانس من مستوى السكر في دمي؟

ج. يساعد جارديانس على إزالة بعض السكر الزائد في جسدك من خلال تمريره إلى بولك.

س. كيف أستعمل جارديانس؟

ج. جارديانس قرص يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميا، مع الطعام أو بدون طعام.

حقق أقصى استفادة من زيارتك لطبيبك.

اتصل بطبيبك عند حدوث أي آثار جانبية

-إذا شعرت بأي آثار جانبية لا تنتظر إلى الزيارة التالية قم بالذهاب إلى طبيبك فوراً
أو اتصل به مباشرةً.



إذا كان لديك أي استفسارات قبل زيارتك
التالية حاول تدوينها.

فيما يلي سؤال قد تود طرحه على طبيبك بعد البدء في استعمال جارديانس:

"هل انخفض مستوى السكري في دمي (الهيموجلوبين السكري) منذ بدئي تناول جارديانس؟"



للإبلاغ عن الآثار الجانبية، الرجاء التواصل مع:

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية

الموقع الإلكتروني لاستقبال البلاغات [/https://ade.sfda.gov.sa](https://ade.sfda.gov.sa)

أو عن طريق البريد الإلكتروني NPC.drug@sfda.gov.sa

أو الرقم الموحد 19999

أو عن طريق الفاكس +966-11-2057662

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إبلاغ شركة بويهريينغر إنجيلهيم.

إدارة التيقظ الدوائي:

البريد الإلكتروني PV_local_Saudi_Arabia@boehringer-ingenelheim.com

الهاتف: +966-11- 5116-500

إن أنشطة تقليل المخاطر معتمدة من قبل هيئة العامة للغذاء والدواء
لطلب مزيد من النسخ الرجاء إرسال طلب بالكميات المطلوبة ورقم الاتصال على البريد الإلكتروني

PV_local_Saudi_Arabia@boehringer-ingenelheim.com



Boehringer
Ingelheim

بويهرينغر إنجيلهيم
ص. ب ٦٨٤٢٣
الرياض ١١٥٢٧ - المملكة العربية السعودية

Jardiance®
(empagliflozin)